

Gebrauchsinformation

Aciclo-CT

Wirkstoff: Aciclovir

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Zusammensetzung

Arzneilich wirksamer Bestandteil:
1 g Creme enthält 50 mg Aciclovir.

Sonstige Bestandteile:

Propylenglycol, weißes Vaseline, Cetylstearylalkohol, dickflüssiges Paraffin, Poloxamer 407, Natriumdodecylsulfat, gereinigtes Wasser.

Darreichungsform und Inhalt

Tube zu 2 g Creme

Stoff- oder Indikationsgruppe

Aciclo-CT ist ein Arzneimittel zur Behandlung von Virusinfektionen (Virustatikum).

CT Arzneimittel GmbH

Lengeder Str. 42a · 13407 Berlin · Telefon: 0 30 / 40 90 08-0
Telefax: 0 30 / 40 90 08-21 · www.ct-arzneimittel.de

Anwendungsgebiete

Zur lindernden Behandlung von Schmerzen und Juckreiz bei häufig wiederkehrenden Herpesinfektionen mit Bläschenbildung im Lippenbereich (rezidivierender Herpes labialis).

Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie Aciclo-CT nicht anwenden?

Sie dürfen Aciclo-CT nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegen Aciclovir oder einen der sonstigen Bestandteile. Sie dürfen Aciclo-CT nicht auf Schleimhäute (z. B. in der Mundhöhle oder am Auge) auftragen, da sonst mit örtlichen Reizerscheinungen zu rechnen ist.

Wann dürfen Sie Aciclo-CT erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt anwenden?

Im Folgenden wird beschrieben, wann Sie Aciclo-CT nur unter bestimmten Bedingungen und nur mit besonderer Vorsicht anwenden dürfen. Befragen Sie hierzu bitte Ihren Arzt. Dies gilt auch, wenn diese Angaben bei Ihnen früher einmal zutrafen.

Falls bei Ihnen eine schwere Störung der körpereigenen Immunabwehr vorliegt, sollten Sie Ihren Arzt vor Behandlungsbeginn darauf hinweisen.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Welche anderen Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von Aciclo-CT oder werden selbst in ihrer Wirkung durch Aciclo-CT beeinflusst?

Für Aciclo-CT sind bisher keine Wechselwirkungen mit anderen Mitteln bekannt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Aciclo-CT nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Aciclo-CT sonst nicht richtig wirken kann.

Wie oft und in welcher Menge sollten Sie Aciclo-CT anwenden?

Sie sollten die Creme 5-mal täglich alle 4 Stunden tagsüber auf die infizierten Hautbereiche dünn auftragen.

Wie und wann sollten Sie Aciclo-CT anwenden?

Sie sollten Aciclo-CT mittels eines Wattestäbchens auftragen, indem Sie dieses mit einer für die Größe der infizierten Hautbereiche notwendigen Menge bestreichen. Beim Auftragen sollten Sie darauf achten, dass Sie nicht nur die bereits sichtbaren Anzeichen des Herpes (Bläschen, Schwellung, Rötung) mit der Creme bedecken, sondern dass Sie auch angrenzende Bereiche in die Behandlung mit einbeziehen. Falls Sie die Creme mit der Hand auftragen, sollten Sie diese vorher und nachher intensiv reinigen, um eine zusätzliche Infektion der geschädigten Hautpartie (z. B. durch Bakterien) bzw. eine Übertragung der Viren auf noch nicht infizierte Schleimhaut- und Hautbereiche zu verhindern.



Besonderer Hinweis:

Um einen größtmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, sollte Aciclo-CT bereits bei den ersten Anzeichen der Herpeserkrankung (Brennen, Jucken, Spannungsgefühl und Rötung) angewendet werden.

Wie lange sollten Sie Aciclo-CT anwenden?

Die Behandlungsdauer beträgt im Allgemeinen 5 Tage.

Kommt es während der Behandlung zu einer Verschlechterung der Hauterscheinungen oder sind spätestens nach 10 Tagen Behandlungsdauer die Bläschen nicht verkrustet oder abgeheilt, so ist die Behandlung abzubrechen und ein Arzt aufzusuchen.

Überdosierung und andere Anwendungsfehler

Was müssen Sie beachten, wenn Sie eine Anwendung vergessen haben?

Setzen Sie die Behandlung wie verordnet fort (tragen Sie die Creme z. B. nicht häufiger oder dicker auf).

Was müssen Sie beachten, wenn Sie die Behandlung unterbrechen oder vorzeitig beenden wollen?

Für eine erfolgreiche Behandlung ist es wichtig Aciclo-CT ausreichend lange anzuwenden (siehe auch „Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung“).

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Aciclo-CT auftreten, und welche Gegenmaßnahmen sind gegebenenfalls zu empfehlen?

Nach der Anwendung von Aciclo-CT kann vorübergehendes Brennen oder Stechen auf den behandelten Hautabschnitten auftreten. Rötung, Eintrocknung, Juckreiz und Abschuppung der mit Aciclo-CT behandelten Haut wurden gelegentlich beobachtet. Selten wurde nach Anwendung von Aciclo-CT vom Auftreten einer allergischen Hautreaktion (Kontaktdermatitis) berichtet. Wurden allergologische Untersuchungen durchgeführt, erwiesen sich in den meisten Fällen die Hilfsstoffe der Creme-Grundlage und nicht der Wirkstoff Aciclovir als Ursache der Hautreaktion. Eine Kontaktdermatitis ist daran zu erkennen, dass die oben genannten Nebenwirkungen verstärkt auftreten und über die mit der Creme behandelten Hautabschnitte hinausgehen. In solchen Fällen sprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Verfallsdatum dieses Arzneimittels ist auf der Fallschachtel und dem Etikett aufgedruckt. Verwenden Sie dieses Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum!

Wie sollten Sie Aciclo-CT aufbewahren?

Nicht unter 8 °C bzw. über 25 °C aufbewahren!

Stand der Information:

Januar 2005

Arzneimittel sind für Kinder unzugänglich aufzubewahren!

CT Arzneimittel wünscht Ihnen gute Besserung!

