

WAS IST SUPRADYN® FORTE?

Nahrungsergänzungsmittel mit 13 Vitaminen, 9 Mineralstoffen und Coenzym Q10.

*Die Vitamine B₁, B₂, B₆, Niacin und Vitamin C tragen zu einem **normalen Energiestoffwechsel** und zur **Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung** bei.

1 FILMTABLETTE ENTHÄLT:

VITAMINE		% Referenzmenge ¹
Vitamin A	800 µg	100 %
Vitamin B ₁ (Thiamin)	3,3 mg	300 %
Vitamin B ₂ (Riboflavin)	4,2 mg	300 %
Vitamin B ₆	2,0 mg	143 %
Vitamin B ₁₂	3,0 µg	120 %
Vitamin C	180 mg	225 %
Vitamin D	5,0 µg	100 %
Vitamin E	12 mg	100 %
Vitamin K	25 µg	33 %
Pantothensäure	18 mg	300 %
Biotin	50 µg	100 %
Folsäure	200 µg	100 %
Niacin	48 mg	300 %

MINERALSTOFFE & SPURENELEMENTE

Calcium	120 mg	15 %
Magnesium	80 mg	21 %
Eisen	14 mg	100 %
Kupfer	1,0 mg	100 %
Jod	150 µg	100 %
Mangan	2,0 mg	100 %
Selen	50 µg	91 %
Molybdän	50 µg	100 %
Zink	10 mg	100 %

ANDERE

Coenzym Q10	4,5 mg	k.A.
-------------	--------	------

¹ Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (Erwachsene) nach Lebensmittelinformationsverordnung.

VERZEHRPFEHLUNG

Empfohlene tägliche Verzehrsmenge für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren: 1 Filmtablette pro Tag. Die Einnahme erfolgt am besten mit oder nach einer Mahlzeit. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden.

60 Filmtabletten = **79,5 g**

ZUTATEN

Calciumphosphat, Füllstoff Mikrokristalline Cellulose, L-Ascorbinsäure, Magnesiumoxid, Nicotinamid, Eisenfumarat, Zinkcitrat, Überzugsmittel Hydroxypropylmethylcellulose, Calcium-D-pantothenat, DL- α -Tocopheryllacetat, Trennmittel vernetzte Natriumcarboxymethylcellulose, Farbstoff Titandioxid, Trennmittel Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Mangansulfat, Coenzym Q10, Trennmittel Siliciumdioxid, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Kupfersulfat, Pyridoxinhydrochlorid, Verdickungsmittel Polyvinylpyrrolidon, Retinylpalmitat, Farbstoff Eisenoxid gelb, Schaumverhüter Polysorbat 80, Pteroylmonoglutaminsäure, Kaliumiodid, Natriumselenat, Natriummolybdat, D-Biotin, Phytomenadion, Cholecalciferol, Cyanocobalamin, Füllstoff Calciumphosphat, Trennmittel Calciumsilicat, Füllstoff Polydextrose, Trennmittel Talkum, Überzugsmittel Polyethylenglycol 4000.

AUFBEWAHRUNG

Trocken und nicht über 30° C lagern. Das Behältnis fest verschlossen halten. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.
Mindestens haltbar bis Ende: siehe Bodenlasche.

WICHTIGE HINWEISE

Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Laktosefrei. Für Diabetiker geeignet.
Supradyn® ist eine eingetragene Handelsmarke.
Erhältlich in der Apotheke.

Vertrieb:

Bayer Austria Ges.m.b.H., Herbststr. 6-10, 1160 Wien

Bayer



Unterstützt den Energiestoffwechsel



Bei anhaltendem Stress



Bei Müdigkeit und Erschöpfung