

Bolfo[®] Zecken- und Flohschutz-Spray

Zecken- und Flohschutz-Spray für Hunde und Katzen



- Zusammensetzung :** 100 g Spray enthalten:
- Wirkstoff: 0,25 g (2-Isopropoxyphenyl)(methylcarbamat)
- Sonstige Bestandteile, deren Kenntnis für eine zweckgemäße Verabreichung des Mittels erforderlich ist: 2-Propanol (Ph. Eur.), Wasserfreie Citronensäure (Ph. Eur.), Propan, Butan.
- Darreichungsform :** Spray zur Anwendung auf der Haut, Lösung.
- Zieltierarten :** Hund, Katze
- Anwendungsgebiete :** Zur Bekämpfung von Flöhen (*Ctenocephalides* spp.) und Zecken (*Ixodes ricinus*) bei Hunden und Katzen.
- Gegenanzeigen :** Nicht anwenden bei kranken (insbesondere mit mechanischen Verschlüssen der Verdauungs-

Bolfo[®] Zecken- und Flohschutz-Spray

und Harnorgane, bei Asthma bronchiale oder anderen Lungen- und Kreislaufkrankungen) oder rekonvaleszenten Tieren. Das Tierarzneimittel des weiteren nicht anwenden bei: laktierenden Tieren, hochträchtigen Tieren, Welpen unter 3 Monaten, Tieren mit großflächigen Hautläsionen, Tieren, die der Gewinnung von Lebensmitteln dienen.

Besondere Warnhinweise für jede Zieltierart : Keine Angaben.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung :

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung bei Tieren:

Nur zur äußerlichen Anwendung. Nicht in Augen, Nase oder auf andere Schleimhäute der Tiere sprühen. Bei zufälligem Kontakt mit den Augen diese sofort gründlich mit Wasser spülen. Hunde sollten während der ersten drei Tage nach der Anwendung nicht in offenen Gewässern schwimmen.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender:

Nicht in offene Flammen oder auf einen heißen Gegenstand sprühen. Von Zündquellen fernhalten. Dose auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Sprühnebel nicht einatmen. Die Anwendung von Aerosolen kann im Einzelfall zu explosionsfähigen Luft/Gas-Gemischen führen. Nur an gut belüfteten Stellen verwenden. Während der Anwendung nicht essen, trinken oder rauchen. Das Tierarzneimittel reizt die Augen und kann bei Hautkontakt möglicherweise zu allergischen Reaktionen führen. Während der Anwendung daher Augen- und Hautkontakt vermeiden. Schutzhandschuhe tragen und Augen / Gesicht schützen. Empfindliche Personen sollten den Kontakt mit dem Spray vermeiden. Bei versehentlichem Verschlucken kann es zu Anzeichen einer Carbamatvergiftung wie Speicheln, Pupillenverengung, Erbrechen oder Durchfall kommen. Es ist sofort ein Arzt aufzusuchen und das Tierarzneimittel vorzulegen. Bolfo[®] Zecken- und Flohschutz-Spray sollte nicht von schwangeren Frauen im dritten Trimester angewendet werden.

Bolfo® Zecken- und Flohschutz-Spray

Nebenwirkungen :	Keine bekannt.
Anwendung während Trächtigkeit und Laktation :	Carbamate können eine Kontraktion der glatten Muskulatur auslösen. Daher sollte Bolfo® Zecken- und Flohschutz-Spray nicht bei hochträchtigen Tieren angewendet werden. Sicherheitshalber soll das Produkt nicht bei laktierenden Tieren angewendet werden.
Wechselwirkungen mit anderen Mitteln :	Dem Tier nicht gleichzeitig andere Insektizide oder Akarizide verabreichen.
Dosierungsanleitung mit Art und Dauer der Anwendung :	<p>Zur Anwendung auf dem Fell.</p> <p>Das Fell des Tieres gegen den Haarstrich einsprühen, bis das gesamte Fell leicht befeuchtet ist. Nicht in die Augen oder die Nase sprühen. Bei zufälligem Kontakt mit den Augen diese sofort ausspülen.</p> <p>Bolfo® Flohschutz-Spray tötet vorhandene Flöhe und Zecken sofort ab. Bei Befall mit Zecken werden diese zwar durch die Behandlung mit Bolfo® Flohschutz-Spray abgetötet, verbleiben aber zumeist in der Haut der Tiere verankert und sollten daher, sofern möglich, manuell entfernt werden. Bei Flohbefall sind alle Tiere in demselben Haushalt mit einem hierfür zugelassenen Insektizid zu behandeln.</p> <p>Da Bolfo® Zecken- und Flohschutz-Spray keine besondere Langzeitwirkung entfaltet, kann durch schlüpfende Flöhe in der Umgebung ein rascher Neubefall der Tiere stattfinden. Zur Unterstützung der Behandlung wird daher empfohlen, auch das Lager der Tiere, die direkte Umgebung sowie die bevorzugten Aufenthaltsorte der Tiere mit einem geeigneten Insektizid oder Insektenentwicklungshemmer (sogenannte "IGRs") zu behandeln.</p>
Überdosierung :	Bei Tests mit Hunden und Katzen zeigten sich nach Verabreichung der doppelten Dosis des Wirkstoffs keine Anzeichen für Unverträglichkeiten. Bei mehrfacher Überdosierung und eventuellem Verschlucken kann es jedoch zu Anzeichen einer Carbamatvergiftung kommen, wie vermehrter Speichelfluss, Pupillenverengung, Erbrechen oder Durchfall. In diesen Fällen

Bolfo[®] Zecken- und Flohschutz-Spray



sofort einen Tierarzt aufsuchen. Gegenmittel:
Atropinsulfat.

Wartezeit : Nicht bei Tieren anwenden, die der Gewinnung von
Lebensmitteln dienen.

Unverträglichkeiten : Keine bekannt.

**Besondere Lager- und
Aufbewahrungshinweise :** Behälter steht unter Druck. Vor Sonneneinstrahlung
schützen und nicht über 30° C lagern. Nicht im
Kühlschrank lagern. Nicht einfrieren.

**Art und Beschaffenheit
des Behältnisses :** Spraydose aus unbeschichtetem Weißblech oder
Aluminium mit 250 ml Lösung.

Verschreibungsstatus : Freiverkäuflich