



Lopedium® T akut bei akutem Durchfall

Schnelle Hilfe bei akutem Durchfall

Durch den effektiven Wirkstoff Loperamid wirkt Lopedium® T akut schnell bei akuten Durchfallerkrankungen. Das seit Jahren bewährte Mittel ist gut verträglich und unverzichtbarer Bestandteil jeder Reiseapotheke.



Für Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren

- Wirkt schnell und zuverlässig
- Beruhigt den Darm für viele Stunden
- Gut verträglich
- Ideal auf Reisen

Ursachen für Durchfall

Durchfall ist ein Zeichen dafür, dass die Funktion unseres Darms gestört oder beeinträchtigt ist. Dies kann unterschiedliche Ursachen haben, wie eine Lebensmittelunverträglichkeit (z. B. Glutenunverträglichkeit, Lactoseintoleranz oder Fruktoseintoleranz). Oft lösen auch Infekte wie eine Magen-Darm-Grippe den Durchfall aus z. B. auch durch verdorbene Speisen oder unsauberes Trinkwasser. Gelangen Krankheitserreger in den Darm, versuchen diese sich auf der Schleimhaut anzusiedeln und lösen Entzündungen aus. Der Darm beschleunigt seine Bewegung, dadurch gelangen aus der Nahrung weniger Wasser und Nährstoffe in den Körper. Gleichzeitig gibt die Darmwand Wasser und Elektrolyte in den Darm ab. Der Darminhalt wird sehr flüssig und man hat Durchfall.

Bringt Ruhe in den Darm

Lopedium® T akut bei akutem Durchfall verlangsamt die erhöhte Darmbewegung. Dadurch hat der Körper mehr Zeit, Wasser und Elektrolyte aufzunehmen. Der Stuhl kann wieder fest werden. Gleichzeitig können die Krankheitserreger durch das Immunsystem bekämpft werden.

In 3 praktischen Darreichungsformen

Lopedium® akut lingual 2 mg Schmelztabletten



Lopedium® akut bei akutem Durchfall, 2 mg Hartkapseln



Lopedium® T akut bei akutem Durchfall, 2 mg Tabletten



ANWENDUNGSGEBIET:

Zur Behandlung der Symptome von akutem Durchfall, sofern keine Behandlung der Krankheitsursache zur Verfügung steht. Eine über 2 Tage hinausgehende Behandlung mit Lopedium® T akut darf nur nach ärztlicher Verordnung erfolgen.



BEWÄHRTER WIRKSTOFF FÜR DIE HAUSAPOTHEKE

Lopedium® T akut bei akutem Durchfall enthält mit Loperamid einen bewährten und gut erforschten Wirkstoff. Lopedium® T akut bei akutem Durchfall ist gut verträglich und sorgt für eine rasche Besserung der Beschwerden.



BEI STRESS

Zu viel Stress kann sich negativ auf unseren Alltag und unsere Verdauung auswirken. Stress kann die Verdauung aus dem Gleichgewicht bringen und somit Durchfall auslösen.



IM URLAUB

Wer kann schon Durchfall im Urlaub gebrauchen? Doch vor allem im Urlaub kommt es durch Zeit- und Klimaumstellung, fettige oder scharfe Speisen und verunreinigtes Trinkwasser häufig zu Durchfall. Lopedium® T akut bei akutem Durchfall kann diesen stoppen, damit Sie Ihren Urlaub wieder genießen können. Aus diesem Grund gehört Lopedium® T akut in jede Reiseapotheke.

DIE EMPFOHLENE DOSIS VON LOPEDIUM® T AKUT BEI AKUTEM DURCHFALL HARTKAPSELN:

ALTER	ERSTDOSIS	WIEDERHOLUNGSDOSIS	TAGESHÖCHSTDOSIS
Jugendliche ab 12 Jahren*	1 Tablette (= 2 mg Loperamidhydrochlorid)	1 Tablette (= 2 mg Loperamidhydrochlorid)	4 Tabletten (= 8 mg Loperamidhydrochlorid)
Erwachsene	2 Tabletten (= 4 mg Loperamidhydrochlorid)	1 Tablette (= 2 mg Loperamidhydrochlorid)	6 Tabletten (= 12 mg Loperamidhydrochlorid)

*Lopedium® akut lingual Schmelztabletten: Für Jugendliche ab 15 Jahren

Zu Beginn der Behandlung von akuten Durchfällen erfolgt die Einnahme der Erstdosis. Danach soll nach jedem ungeformten Stuhl die Wiederholungsdosis eingenommen werden. Die empfohlene Tageshöchstdosis darf nicht überschritten werden. Lopedium® T akut bei akutem Durchfall ist für Kinder unter 12 Jahren nicht geeignet.

HÄUFIGE FRAGEN & ANTWORTEN:

Wann spricht man von Durchfall?

Die Stuhlhäufigkeit und -beschaffenheit ist von Person zu Person verschieden. Bei Erwachsenen spricht man von Durchfall, wenn mehr als 3 ungeformte Stühle täglich vorkommen, bei denen der Stuhl dünnflüssig ist und/oder die Stuhlmenge erhöht ist.

Kann Lopedium® T akut bei akutem Durchfall auch in der Schwangerschaft und Stillzeit eingenommen werden?

Lopedium® T akut bei akutem Durchfall sollte nur nach Rücksprache mit einem Arzt oder Apotheker in der Schwangerschaft oder in der Stillzeit eingenommen werden.

Wie lange kann Lopedium® T akut bei akutem Durchfall eingenommen werden?

Lopedium® T akut bei akutem Durchfall sollte ohne ärztlichen Rat nicht länger als 2 Tage eingenommen werden. Wenn der Durchfall nach 2 Tagen Behandlung mit Lopedium® T akut bei akutem Durchfall weiterhin besteht, muss das Arzneimittel abgesetzt werden und ein Arzt aufgesucht werden. Eine über 2 Tage hinausgehende Behandlung darf nur unter ärztlicher Verordnung und Verlaufsbeobachtung erfolgen.

Was ist sonst noch bei der Einnahme von Lopedium® T akut zu beachten?

Achten Sie auf einen ausreichenden Ersatz von Flüssigkeiten und Salzen (Elektrolyten). Dies ist die wichtigste Behandlungsmaßnahme bei Durchfall, da es dabei zu großen Flüssigkeits- und Salzverlusten kommen kann. Dies gilt insbesondere für Kinder.

Lopedium® T akut bei akutem Durchfall führt zu einer Beendigung des Durchfalls, wobei die Ursache nicht behoben wird. Wenn möglich, sollte auch die Ursache behandelt werden. Sprechen Sie deshalb mit Ihrem Arzt.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen.

Lopedium® akut bei akutem Durchfall, 2 mg Hartkapseln/Lopedium® T akut bei akutem Durchfall, 2 mg Tabletten

Wirkstoff: Loperamidhydrochlorid. **Anwendungsgebiet:** Zur symptomatischen Behandlung von akuten Durchfällen für Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene, sofern keine ursächliche Therapie zur Verfügung steht. Eine über 2 Tage hinausgehende Behandlung mit Loperamidhydrochlorid darf nur unter ärztlicher Verordnung und Verlaufsbeobachtung erfolgen. **Warnhinweis:** Enthält Lactose. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke! **Mat.-Nr.:** 2/51016089 **Stand:** Juli 2023 Hexal AG, 83607 Holtkirchen, www.hexal.de

Lopedium® akut lingual 2 mg Schmelztabletten

Wirkstoff: Loperamidhydrochlorid. **Anwendungsgebiet:** Zur Behandlung der Symptome einer akuten Durchfallerkrankung bei Erwachsenen und Kindern ab 15 Jahren. Darf nicht länger als 2 Tage angewendet werden, es sei denn auf ärztlichen Rat, unter ärztlicher Aufsicht und unter ärztlicher Überwachung. **Warnhinweis:** Enthält Saccharose und Aspartam. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke! **Mat.-Nr.:** 2/51016753 **Stand:** Juli 2024 Hexal AG, 83607 Holtkirchen, www.hexal.de

MLR-3097-02/2025