

Gebrauchsinformation

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollten. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt, Apotheker oder Heilpraktiker.

ASPAS spag. Peka Mischung / Homöopathisches Arzneimittel

Zusammensetzung: 10 g (=10,20ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile

Atropa belladonna spag. Peka Dil. D4 (HAB, V. 47a)	1,20 g
Cuprum aceticum Dil. D4 [D4 mit Ethanol 15% (m/m)]	1,30 g
Hyoscyamus niger spag. Peka Dil. D4 (HAB, V. 47a)	1,20 g
Strychnos ignatii spag. Peka Dil. D4 (HAB, V. 47b)	1,40 g
Secale cornutum spag. Peka Dil. D4 (HAB, V. 47b)	0,90 g
Nicotiana tabacum Dil. D6 [ab D4 mit Ethanol 15% (m/m)]	1,30 g
Ammi visnaga spag. Peka Ø (HAB, V. 47b)	1,10 g
Potentilla anserina spag. Peka Ø (HAB, V. 47a)	1,60 g

1 g entspricht 39 Tropfen.

Enthält 19 Vol.-% Alkohol.

Darreichungsform und Packungsgröße:

Originalpackung mit 50 ml und 100 ml Mischung.
(unverkäufliches Muster mit 50 ml Mischung).

Name und Anschrift des pharmazeutischen Unternehmens und Herstellers:

PEKANA®-Naturheilmittel GmbH · Raiffeisenstrasse 15 · D-88353 Kisslegg
Telefon 075 63/9 11 60 · Telefax 075 63/28 62 email: info@pekana.com · www.pekana.com

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

Gegenanzeigen: Keine bekannt.

Vorsichtsmaßnahmen: Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es sollte deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden. Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Wechselwirkungen: Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.



