



ASS 100 mg HEXAL®

ASS 100 mg HEXAL® Thrombozyten- aggregationshemmer



Herz-Kreislauf-erkrankungen wie Herzinfarkt und Vorboten eines Schlaganfalls

- Zur Standardtherapie bei **akutem Herzinfarkt**
- Zur Standardtherapie bei **Durchblutungsstörungen im Herzen (instabile Angina pectoris)**
- **Zur Vorbeugung** eines weiteren **Herzinfarktes** und **zur Vorbeugung** bei Risiko einer **transitorischen ischämischen Attacke (TIA)** und **Hirninfarkten**
- Zur **Behandlung nach arteriellen gefäßchirurgischen oder interventionellen Operationen**

Der Wirkstoff Acetylsalicylsäure (ASS)

Acetylsalicylsäure (ASS) hemmt als Thrombozytenaggregationshemmer das Verklumpen von Blutplättchen, wodurch das Blut dünnflüssig bleibt und nicht gerinnen kann. Dadurch wird der Verstopfung der Gefäße durch Blutgerinnsel vorgebeugt. Diese Wirkweise ist für die Blutgefäße, die das Herz und Gehirn versorgen wichtig, denn sobald diese durch Blutgerinnsel verstopfen, kann ein Herzinfarkt oder Schlaganfall die Folge sein. Mit der niedrigen Dosierung von 100 mg Acetylsalicylsäure in ASS 100 mg HEXAL®, kann somit das Risiko eines eintretenden erneuten Herz- oder eines Hirninfarktes gesenkt werden.

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG:

Die Tabletten sollten möglichst nach der Mahlzeit und mit reichlich Wasser eingenommen werden. Grundsätzlich ist von einer Einnahme auf nüchternen Magen abzuraten!

Bei Herzschmerzen aufgrund von Durchblutungsstörungen in den Herzkranzgefäßen (instabiler Angina pectoris):
Nehmen Sie 1x täglich 1 Tablette (entsprechend 100 mg Acetylsalicylsäure) ein.

Bei akutem Herzinfarkt (akuter Myokardinfarkt):
Nehmen Sie 1x täglich 1 Tablette (entsprechend 100 mg Acetylsalicylsäure) ein. Die 1. Tablette sollte zerbissen oder zerkaut werden.

Zur Vorbeugung eines weiteren Herzinfarktes nach erstem Herzinfarkt:
Nehmen Sie täglich 3 Tabletten (entsprechend 300 mg Acetylsalicylsäure) ein.

Nach arteriellen gefäßchirurgischen oder interventionellen Eingriffen (z. B. ACVB, PTCA):
Nehmen Sie 1x täglich 1 Tablette (entsprechend 100 mg Acetylsalicylsäure) ein.

Zur Prophylaxe bei Schlaganfallrisiko:
Nehmen Sie 1x täglich 1 Tablette (entsprechend 100 mg Acetylsalicylsäure) ein.

ASS 100 mg HEXAL® ist zur längerfristigen Anwendung vorgesehen. Über die Dauer der Anwendung entscheidet der behandelnde Arzt. Bitte unterbrechen oder beenden Sie die Behandlung mit ASS 100 mg HEXAL® nicht, ohne dies vorher mit Ihrem Arzt abgesprochen zu haben.

Hinweis: ASS 100 mg HEXAL® eignet sich aufgrund seines Wirkstoffgehaltes nicht zur Behandlung von Schmerzzuständen.

HÄUFIGE FRAGEN & ANTWORTEN

Welche Risikofaktoren begünstigen einen Herzinfarkt oder Schlaganfall?

Folgende Faktoren können Ihr Risiko für einen Infarkt erhöhen:

- Nikotinkonsum
- Bluthochdruck
- Erhöhte Blutfettwerte
- Diabetes mellitus
- Übergewicht und Adipositas (Fettleibigkeit)
- Bewegungsmangel
- Ernährung

Außerdem nimmt das Risiko für einen Herzinfarkt oder Schlaganfall grundsätzlich mit zunehmendem Alter oder insbesondere nach bereits erlittenen Infarkten zu.

Wie kann ich das Risiko für einen Herzinfarkt oder Schlaganfall senken?

- Sport: insbesondere Ausdauertraining wirkt durchblutungsfördernd und erhöht den Sauerstoffwechsel
- Übergewicht vermeiden: ein zu hohes Gewicht führt zu erhöhtem Blutdruck und Blutfettwerten, was wiederum das Risiko erhöht
- Überwachung des Blutdrucks: Hypertonie (hoher Blutdruck) kann durch einen Arzt behandelt werden
- Ausgewogene Ernährung: Spinat, Blattsalat, Vollkornprodukte, Beeren, Lachs, Nüsse, Hülsenfrüchte oder Olivenöl wirken sich positiv auf das Herz-Kreislaufsystem aus
- Entspannen: sehr viel Stress auf einen langen Zeitraum belastet auch das Herz-Kreislaufsystem, also legen Sie wert auf Pausen und Entspannungsmethoden
- Wasser: ausreichend Wasser zu trinken, begünstigt eine Verflüssigung des Blutes, wodurch es so besser durch die Gefäße fließen kann
- Rauchen vermeiden: Nikotin fördert die Blutgerinnung und somit steigt das Risiko einer Thrombose

Wann darf ich ASS 100 mg HEXAL® nicht anwenden?

ASS 100 mg HEXAL® darf nicht angewendet werden:

- wenn Sie allergisch gegen Acetylsalicylsäure, Salicylate, mikrokristalline Cellulose, vorverkleisterte Stärke (Mais), hochdisperses Siliciumdioxid, Stearinsäure (Ph Eur.) oder einen der sonstigen Bestandteile des Arzneimittels sind
- wenn Sie in der Vergangenheit auf bestimmte Arzneimittel gegen Schmerzen, Fieber oder Entzündungen (Salicylate oder andere nichtsteroidale Entzündungshemmer) mit Asthmaanfällen oder in anderer Weise allergisch reagiert haben
- bei akuten Magen- und Darmgeschwüren
- bei krankhaft erhöhter Blutungsneigung (hämorrhagische Diathese)
- bei Leber- oder Nierenversagen
- bei schwerer, nicht durch Medikamente eingestellter Herzmuskelschwäche (Herzinsuffizienz)
- wenn Sie gleichzeitig 15 mg oder mehr Methotrexat pro Woche einnehmen
- in den letzten 3 Monaten der Schwangerschaft in einer Dosierung von mehr als 150 mg Acetylsalicylsäure pro Tag

Was muss ich außerdem beachten, wenn ich ASS 100 mg HEXAL® einnehme?

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie ASS 100 mg HEXAL® einnehmen:

- bei einer Überempfindlichkeit (Allergie) gegen andere schmerz- und entzündungshemmende Arzneimittel, andere Arzneimittel gegen Rheuma oder gegen andere Allergie auslösende Stoffe
- bei gleichzeitiger Einnahme von nichtsteroidalen Entzündungshemmern wie z. B. Ibuprofen und Naproxen (Arzneimittel gegen Schmerzen, Fieber oder Entzündungen)
- bei Bestehen von anderen Allergien (z. B. mit Hautreaktionen, Juckreiz, Nesselfieber)
- bei Asthma bronchiale, Heuschnupfen, Nasenschleimhautschwellungen (Nasenpolypen) oder chronischen Atemwegserkrankungen
- bei gleichzeitiger Behandlung mit gerinnungshemmenden Arzneimitteln (z. B. Cumarin-Derivate, Heparin - mit Ausnahme niedrig dosierter Heparin-Behandlung)
- bei Magen- und Darmgeschwüren oder Magen-Darm-Blutungen in der Vorgeschichte
- bei eingeschränkter Leberfunktion
- bei eingeschränkter Nierenfunktion oder verminderter Herz- und Gefäßdurchblutung (z. B. Gefäßerkrankung der Nieren, Herzmuskelschwäche, Verringerung des Blutvolumens, größere Operationen, Blutvergiftung oder stärkere Blutungen): Acetylsalicylsäure kann das Risiko einer Nierenfunktionsstörung und eines akuten Nierenversagens weiter erhöhen.
- vor Operationen (auch bei kleineren Eingriffen wie z. B. Ziehen eines Zahnes): Es kann zur verstärkten Blutungsneigung kommen. Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Zahnarzt, wenn Sie ASS 100 mg HEXAL® eingenommen haben.
- bei Patienten mit schwerem Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenasemangel: Acetylsalicylsäure kann einen beschleunigten Abbau bzw. Zerfall der roten Blutkörperchen oder eine bestimmte Form von Blutarmut bewirken. Dieses Risiko kann durch Faktoren wie z. B. hohe Dosierung, Fieber oder akute Infektionen, erhöht werden.

Acetylsalicylsäure vermindert in niedriger Dosierung die Harnsäureausscheidung. Bei entsprechend gefährdeten Patienten kann dies unter Umständen einen Gichtanfall auslösen. Wenn Sie sich schneiden oder verletzen, kann es eventuell etwas länger als sonst dauern, bis eine Blutung zum Stillstand kommt. Dies hängt mit der Wirkung von ASS 100 mg HEXAL® zusammen. Kleinere Schnitte und Verletzungen (z. B. beim Rasieren) sind in der Regel ohne Bedeutung. Bei ungewöhnlichen Blutungen (an ungewöhnlicher Stelle oder von ungewöhnlicher Dauer) wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Acetylsalicylsäure-haltige Arzneimittel sollen längere Zeit oder in höheren Dosen nicht ohne Befragen des Arztes angewendet werden.

Bitte beachten Sie bezüglich der oben genannten Angaben immer die aktuelle Gebrauchsinformation.

ASS 100 mg HEXAL® Tabletten:

Wirkstoff: Acetylsalicylsäure. **Anwendungsgebiete:** Bei instabiler Angina pectoris (Herzschmerzen aufgrund von Durchblutungsstörungen in den Herzkranzgefäßen) - als Teil der Standardtherapie; bei akutem Herzinfarkt - als Teil der Standardtherapie; zur Vorbeugung eines weiteren Herzinfarktes nach erstem Herzinfarkt (zur Reinfarktprophylaxe); nach Operationen oder anderen Eingriffen an arteriellen Blutgefäßen (nach arteriellen gefäßchirurgischen oder interventionellen Eingriffen, z. B. nach aortokoronarem Venen-Bypass [ACVB], bei perkutaner transluminaler koronarer Angioplastie [PTCA]); zur Vorbeugung von vorübergehender Mangel durchblutung im Gehirn (TIA: transitorisch ischämische Attacken) und Hirninfarkten, nachdem Vorläuferstadien (z. B. vorübergehende Lähmungserscheinungen im Gesicht oder der Armmuskulatur oder vorübergehender Sehverlust) aufgetreten sind. **Hinweis:** ASS 100 mg HEXAL eignet sich nicht zur Behandlung von Schmerzzuständen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker! **Mat.-Nr.:** 2/51014439

Stand: April 2021
Hexal AG, 83607 Holzkirchen, www.hexal.de