

## **Gebrauchsinformation**

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen.

### **B2-ASmedic<sup>®</sup>**

Tablette mit 10 mg Riboflavin

Wirkstoff: Riboflavin

### **Stoffgruppe:**

Vitaminpräparat

### **Anwendungsgebiete:**

Vitamin-B<sub>2</sub>-Mangelzustände, wie entzündliche Veränderungen der Haut und Schleimhäute; Störungen der Vitamin-B<sub>2</sub>-Resorption, wie z. B. bei chronischer Entzündung der Darmschleimhaut (Enteritiden) oder Fettstuhl.

### **Was müssen Sie vor der Einnahme von B2-ASmedic<sup>®</sup> beachten?**

#### **Gegenanzeigen:**

*Wann dürfen Sie B2-ASmedic<sup>®</sup> nicht einnehmen?*

Es sind keine Gegenanzeigen bekannt.

#### **Besondere Vorsicht bei der Einnahme von B2-ASmedic<sup>®</sup> ist erforderlich:**

*Was müssen Sie während der Schwangerschaft und in der Stillzeit beachten?*

Es sind keine Einschränkungen bekannt.

*Was müssen Sie im Straßenverkehr sowie bei der Arbeit mit Maschinen und bei Arbeiten ohne sicheren Halt beachten?*

Es sind keine Beeinträchtigungen dieser Tätigkeit durch die Einnahme von B2-ASmedic<sup>®</sup> bekannt.

#### **Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln oder anderen Mitteln:**

*Welche anderen Arzneimittel oder anderen Mittel beeinflussen die Wirkung von B2-ASmedic<sup>®</sup>?*

Die Resorption von Riboflavin kann durch gleichzeitige Gabe von Probenecid vermindert werden.

#### **Warnhinweise:**

Wichtige Warnhinweise über bestimmte Bestandteile von B2-ASmedic®

Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie B2-ASmedic® daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

**Dosierungsanleitung und Art der Anwendung:**

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt B2-ASmedic® nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da B2-ASmedic® sonst nicht richtig wirken kann!

**Dosierung:**

*Wieviel von B2-ASmedic® Tabletten und wie oft sollten Sie B2-ASmedic® anwenden?*

Soweit nicht anders verordnet, nehmen Erwachsene 1- bis 2mal täglich 1 Tablette ein, Kinder 1- bis 2mal täglich ½ Tablette.

**Art der Anwendung:**

*Wie sollten Sie B2-ASmedic® anwenden?*

Tabletten zur oralen Anwendung.

**Wenden Sie sich bei Fragen zur Klärung der Anwendung bitte an Ihren Arzt oder Apotheker!**

**Nebenwirkungen:**

*Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von B2-ASmedic® auftreten?*

Bei Beachtung der Dosierungsanleitung sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

**Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit und Aufbewahrung des Arzneimittels:**

Das Verfallsdatum dieser Packung ist auf den Blistern und der Faltschachtel aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum.

*Wie ist B2-ASmedic® aufzubewahren?*

Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.

Achten Sie stets darauf, dass Sie B2-ASmedic® so aufbewahren, dass sie für Kinder nicht zu erreichen sind!

**Weitere Informationen:**

**Zusammensetzung:**

**Arzneilich wirksamer Bestandteil:**

1 Tablette enthält 10 mg Riboflavin

**Sonstige Bestandteile:**

Lactose, Maisstärke, mikrokrist. Cellulose, Talkum, Povidon 25, Siliciumdioxid, hydr.  
Rizinusöl

**Darreichungsform und Inhalt:**

Packung mit 20 Tabletten (N1)

Packung mit 50 Tabletten (N2)

**Name und Anschrift des pharmazeutischen Unternehmers und Herstellers:**

Dyckerhoff Pharma GmbH & Co. KG

Robert-Perthel-Straße 49

D-50739 Köln

Tel: 0221 / 95 74 37 – 0

Fax: 0221 / 95 74 37 – 45

**Datum der letzten Überarbeitung:**

November 2008