



# Systane® GELTROPFEN

BENETZUNGSGEL FÜR DIE AUGEN

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf, um sie später noch einmal nachlesen zu können.

## **BESCHREIBUNG:**

**SYSTANE® GELTROPFEN Benetzungsgel für die Augen** lindern mittelschwere bis schwere Symptome des Trockenen Auges. Es kann tagsüber und auch nachts angewendet werden. Die Formulierung wurde speziell zur intensiven Befeuchtung der Augenoberfläche entwickelt. Sie schützt vor weiteren Zellschädigungen.

Bei **SYSTANE® GELTROPFEN** handelt es sich um eine sterile Lösung mit folgenden Inhaltsstoffen: Polyethylenglykol 400, Propylenglykol, Hydroxypropyl-Guar, Sorbitol, Aminomethylpropanol, Borsäure, Kaliumchlorid, Natriumchlorid, Natriumedetat und das Konservierungsmittel POLYQUAD® (Polyquaternium-1) 0,001%.

## **ANWENDUNGSGEBIETE**

**SYSTANE® GELTROPFEN** sind gelartige Benetzungstropfen für die Therapie Trockener Augen.

**SYSTANE® GELTROPFEN** lindert die Symptome Trockener Augen wie Brennen und Irritationen.

## **GEGENANZEIGEN (Gründe gegen eine Anwendung):**

Wenn Sie allergisch gegen einen der Inhaltsstoffe von **SYSTANE® GELTROPFEN** sind, sollten Sie dieses Produkt nicht verwenden.

## **ANWENDUNGSHINWEISE:**


**SYSTANE® GELTROPFEN** kann tagsüber nach Bedarf und auch nachts angewendet werden.

Vor Gebrauch schütteln.

Waschen Sie Ihre Hände, bevor Sie das Benetzungsgel anwenden.

Öffnen Sie die Flasche, ohne die Tropferspitze zu berühren. Halten Sie die Flasche zwischen Daumen und Fingern mit der Öffnung nach unten.

Kopf leicht nach hinten neigen, Blick nach oben richten und mit dem Zeigefinger Unterlid wegziehen.



Durch leichten Druck auf den Flaschenboden der Drop-Tainer®-Flasche 1 Tropfen von oben in den Bindehautsack eintropfen, ohne dass die Flaschenspitze mit dem Auge oder Lidrand in Berührung kommt.



Geben Sie 1 Tropfen ins Auge und blinzeln Sie.



**SYSTANE® GELTROPFEN** kann auch zur Behandlung des Trockenen Auges bei Kontaktlinienträgern angewendet werden, indem vor dem Einsetzen und nach dem Herausnehmen der Linsen getropft wird.

## **WARNHINWEISE:**

Es ist wichtig, dass Sie die Anweisungen Ihres Arztes oder Apothekers und die Packungshinweise zur korrekten Anwendung des Produktes beachten. Wenn es zu anhaltenden Augenbeschwerden, übermäßigem Tränenfluss, Sehveränderungen oder Augenrötung kommt, suchen Sie Ihren Arzt oder Apotheker auf, da sich die Beschwerden verschlimmern könnten.

## **Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:**

Nach der Anwendung von **SYSTANE® GELTROPFEN** kann kurzfristig ein leichtes Verschwommensehen auftreten. Sie sollten erst wieder Auto fahren, ohne sicheren Halt arbeiten oder Maschinen bedienen, wenn diese Anzeichen abgeklungen sind.

## **VORSICHTSMASSNAHMEN:**

- Vermeiden Sie jedes Berühren der Tropferspitze der Flasche oder deren Kontakt mit Gegenständen, um Verunreinigungen zu verhindern.
- Nach Gebrauch wieder verschließen.
- Bei Raumtemperatur aufbewahren.
- Flasche bei Nichtgebrauch stets fest verschlossen halten.
- Vor dem auf Packung und Flasche angegebenen Verfalldatum verwenden.
- Drei Monate nach dem ersten Öffnen sollte das verbleibende Produkt nicht mehr verwendet werden.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

## **PACKUNGSGRÖSSEN:**

**SYSTANE® GELTROPFEN** werden durch eine Kombination aus Dampfsterilisation und Sterilfiltration sterilisiert und sind in Plastikflaschen zu 10 ml und 3 x 10 ml erhältlich.

## **STERILE A**

## **VERTRIEB für Deutschland**

Alcon Pharma GmbH  
Blankreutestraße 1  
79108 Freiburg

## **VERTRIEB für Österreich**

Alcon Ophthalmika GmbH  
Stella-Klein-Löw-Weg 17  
1020 Wien



Alcon Laboratories, Inc.  
6201 South Freeway  
Fort Worth, Texas, USA 76134-2099

## **EC REP**

Alcon Laboratories (U.K.) Ltd.  
Frimley Business Park  
Frimley Camberley  
Surrey, GU16 7SR  
Vereinigtes Königreich

