

Neisseria

Was ist Gonorrhö?

Gonorrhö (ugs. Tripper) ist eine sexuell übertragbare Krankheit, die durch das Bakterium *Neisseria gonorrhoeae* verursacht wird. Dies kann eine Infektion der Harnröhre, der Vagina und des Gebärmutterhalses, des Anus oder des Rachens verursachen.

Du kannst dieses Bakterium während des ungeschützten Geschlechtsverkehrs übertragen. Sowohl Männer als auch Frauen können sich mit Gonorrhö infizieren.

Was ist ein Tripper?

Der Name "Tripper" ist ein anderer Name für die STD (sexually transmitted diseases) Gonorrhö und kommt von dem gelben oder grünen Eiter, der von deinem Penis (Harnröhre) tropft.

Wie bekommt man Gonorrhö?

Der Erreger ist das Bakterium *Neisseria gonorrhoeae*, bekannt als Gonococcus oder Gonokokken. Das Gonorrhö-Bakterium sitzt auf der Schleimhaut von Penis (Harnröhre), Vagina, Anus oder Rachen und verursacht dort eine Infektion.

Während des ungeschützten Geschlechtsverkehrs kann jemand, der infiziert ist, das Bakterium auf einen anderen übertragen. Zum Beispiel, wenn die infizierte Schleimhaut mit der Schleimhaut des Penis, der Vagina, des Anus oder des Rachens in Kontakt kommt. So kann es beim Oralsex (Kontakt zwischen Genitalien und Mund) und beim "Rimming" (Kontakt zwischen Anus und Mund) zu einer Infektion des Rachens kommen, und nach dem Analsex (Kontakt zwischen Penis und Anus) eine Infektion des Anus auftreten.

Personen, die regelmäßig den Sexualpartner wechseln und / oder ungeschützten Sex haben, sind besonders anfällig für eine Gonorrhö-Infektion.

Die Infektion kann auch während der Geburt übertragen werden, wenn das Baby einen infizierten Geburtskanal passiert. Das Neugeborene bekommt dann normalerweise eine Infektion der Augen, die mit einer Schwellung der Augenlider und Eiterbildung einhergehen kann. Letztendlich kann das Sehvermögen des Kindes dadurch gefährdet werden.

Gonorrhö Symptome

Frauen bemerken häufig wenig oder nichts von der Gonorrhö. Männer haben meistens deutliche Symptome. Nicht umsonst nennen wir Gonorrhö bei Männern Tripper. Die ersten Symptome treten ziemlich bald auf, nachdem man sich mit den Gonokokken Bakterien infiziert hat. Auch wenn du keine Beschwerden hast, kannst du die Bakterien übertragen.

Bekannte Symptome, die durch die STD Gonorrhö verursacht werden können, sind:

Bei Frauen:	Bei Männern:
· Schmerzen oder	· Schmerzen oder Irritationen beim Wasser lassen

Irritationen beim Wasser lassen	
· Juckreiz oder Irritationen rund um den Anus	· Juckreiz oder Irritationen rund um den Anus
· Schmierige oder eitrigere Ausscheidungen beim Stuhlgang, bei analer Infektion	· Schmierige oder eitrigere Ausscheidungen beim Stuhlgang, bei analer Infektion
· Rachenentzündung oder geschwollene Drüsen am Hals, mit Halsentzündung	· Rachenentzündung oder geschwollene Drüsen am Hals, mit Halsentzündung
· Diverse andere Entzündungen im Körper	· Diverse andere Entzündungen im Körper
· Mehr vaginaler Ausfluss. Dieser kann übelriechend oder eitrig sein.	· Eitrigere (gelblich oder grünliche) Ausscheidungen aus der Harnröhre
· Zwischenblutungen	

Auch ohne, dass diese Symptome bei dir auftreten, kannst du das Gonorrhö-Bakterium übertragen. Es kommt oft vor, dass eine Ansteckung besteht, ohne dass sich Symptome zeigen. Lasse dich daher regelmäßig (zum Beispiel jährlich) testen, ob du infiziert bist.

Inkubationszeit

Die Inkubationszeit von Gonorrhö beträgt ca. 10 Tage. Es ist also erst ab 10 Tagen nach der möglichen Infektion sinnvoll, sich testen zu lassen. Wenn du dich früher testen lässt, fällt das Testergebnis möglicherweise negativ aus, obwohl du infiziert bist.

Wie ansteckend ist Gonorrhö?

Das Infektionsrisiko hängt von der Infektionsstelle und der Häufigkeit der Sexualkontakte mit dem infizierten Sexualpartner ab. Ganz allgemein gesagt, ist das Ansteckungsrisiko für Gonorrhö hoch.

Die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung bei einem einmaligen, ungeschützten vaginalen Sexualkontakt wird von Frau-nach-Mann auf 20 bis 30% geschätzt und von Mann-nach-Frau auf 50 bis 90%.

Bei mehrfachen sexuellen Kontakten mit demselben Partner steigen diese Chancen für Frau-zu-Mann Übertragung auf rund 50% und für Mann-zu-Frau Übertragung auf 90%. Wie übertragbar die sexuell übertragbare Krankheit bei homosexuellen Männern ist, ist noch nicht bekannt.

Gonorrhö Test

Gonorrhö kann im Labor einfach und mit hoher Zuverlässigkeit festgestellt werden. Dazu machst du einen Gonorrhö-Test. Ein Labor testet auf das Vorhandensein der Bakterien.

Bei Frauen wird das Körpermaterial anhand eines Abstrichs mit einem Wattestäbchen und bei Männern mit einer Urinprobe getestet. Bei einer möglichen Infektion des Anus wird ebenfalls ein Abstrich mit einem Wattestäbchen genommen.

Achtung! Ein Gonorrhö Test bei dem du sofort ein Ergebnis erhältst ist viel unzuverlässiger als ein Test mit Laboranalyse. Aus diesem Grunde wird von Soforttests stark abgeraten.

Einen Gonorrhö-Heim-Test mit Laboranalyse kannst du [hier online bestellen](#) (das Ergebnis erhältst du mit einem eindeutigen anonymen Code innerhalb von 3 Arbeitstagen). Oder du gehst zum Arzt oder ins Gesundheitszentrum (das Testergebnis erhältst du dann normalerweise innerhalb von 1 bis 2 Wochen).

Achtung! Es macht erst 10 Tage nach der möglichen Infektion Sinn, sich mit einem Test zuverlässig auf Gonorrhö untersuchen zu lassen.

Gonorrhö Behandlung

Gonorrhö lassen sich gut mit Antibiotika behandeln. Gehen die Beschwerden nicht weg? Dann gehe sofort wieder zum Arzt. Die Bakterien können gegenüber dem verwendeten Arzneimittel unempfindlich sein. Dies kommt in den Niederlanden nicht so oft vor, im Ausland schon eher.

Schließe die Antibiotika-Kur immer vollständig ab, da sonst die Bakterien resistent werden können. Dies dauert je nach Art der Medikation maximal zwei Wochen. Bei analen Gonorrhö-Infektionen kann dies länger dauern.

Es besteht eine gute Chance, dass du komplett gesund wirst, wenn du wegen Gonorrhö behandelt wurdest. Wenn du frühzeitig eine Antibiotikakur bekommen und sie erfolgreich abgeschlossen hast, heilen die Entzündungen in der Regel vollständig und ohne Folgen ab.

Die Krankheit kann noch bis etwa eine Woche nach Beginn der Behandlung ansteckend sein. Vermeide dann also sexuellen Kontakt oder verwende zumindest ein Kondom, während deiner gesamten Antibiotika-Kur

Warne auch immer deine/n (ehemalige/n) Partner. Warne auf alle Fälle deine/n Sexualpartner der letzten 6 Monate, vorzugsweise der letzten 12 Monate. So können sie sich rechtzeitig testen und – falls nötig – behandeln lassen.

Tipp: Das Testergebnis von [Thuistesten.com](https://www.thuistesten.com) kannst du als pdf ausdrucken oder deinem Hausarzt per E-Mail schicken. Er oder sie kann damit genau sehen, wie der Test ausgeführt wurde und welche Medikamente du benötigst.

Folgen von unbehandelter Gonorrhö

Es ist wichtig, dass Gonorrhö rechtzeitig behandelt wird. Eine unbehandelte Infektion kann schwerwiegende Folgen haben.

Bei Frauen:	Bei Männern:
· Entzündungen der Eileiter	· Entzündung der Hoden
· verminderte Fruchtbarkeit	· Entzündung der Prostata
· Erhöhtes Risiko für eine Schwangerschaft außerhalb der Gebärmutter	
Bei Schwangerschaft: erhöhte Chance auf Frühgeburt und Ansteckung des Babys mit Gonorrhö (Augeninfektionen)	

Kann Gonorrhö zurückkommen?

Ja, du baust für dieses Bakterium keine Immunität auf. Wenn du behandelt wirst, verschwindet das Bakterium aus deinem Körper, aber du kannst wieder angesteckt werden. Deshalb lieber mit einem Kondom sicher sein und sich regelmäßig testen lassen, wenn du mit mehr als 1 (ständigen) Partner sexuell aktiv bist.

Wie kannst du Gonorrhö vorbeugen?

Gonorrhö kann durch Safer Sex vorgebeugt werden. Safer Sex zur Verhinderung einer sexuell übertragbaren Krankheit kann auf folgende Weise erfolgen:

- Nur (Zungen-) Küsse, umarmen, massieren, masturbieren oder von Hand befriedigen.
- Verwende ein Kondom für die vaginale Penetration
- Verwende ein Kondom mit zusätzlichem Gleitmittel für die Analpenetration
- Verwende ein Kondom für männlichen Oralsex (Blasen)
- Benutze ein Lecktuch für Oralsex mit der Frau (Lecken)
- Verwende ein Lecktuch für Oralsex am Anus

Wenn du und dein Partner noch nie mit jemandem geschlafen habt und ihr beide keine sexuell übertragbare Krankheit wie Gonorrhö habt, bleibt ihr beide auch ohne Infektion.

Kontrolliere dich selbst mit einem zuverlässigen Heimtest

Wenn du dich auf Gonorrhö testen lassen möchtest, kannst du einen [STD-Test online bestellen](#). Du sendest dann ein wenig Körpermaterial anonym an ein zertifiziertes Labor und erhältst das Ergebnis innerhalb von 3 Werktagen über diese Website.