

Pflichttext:

Dobendan Direkt Lutschtabletten und Dobendan Direkt Spray enthalten 8,75 mg Flurbiprofen pro Einzeldosis. Nicht mehr als 5 Einzeldosen a 8,75 mg Flurbiprofen in einem Zeitraum von 24 Stunden anwenden.

**Dobendan Direkt Flurbiprofen Spray 8,75 mg/Dosis Spray zur Anwendung in der Mundhöhle, Lösung
Dobendan® Direkt Flurbiprofen 8,75 mg Lutschtabletten
Dobendan® Direkt Zuckerrfrei Flurbiprofen 8,75 mg Lutschtabletten**

Wirkstoff: Flurbiprofen

Anwendungsgebiete: Dobendan Direkt Spray: zur kurzzeitigen symptomatischen Behandlung von akuten Halsschmerzen bei Erwachsenen. Dobendan Direkt / Direkt Zuckerrfrei Lutschtabletten: Zur kurzzeitigen symptomatischen Behandlung bei schmerzhaften Entzündungen der Rachenschleimhaut bei Erwachsenen und Kindern ab 12 Jahren.

Warnhinweise Dobendan Direkt Spray enthält: Methyl-4-hydroxybenzoat (Ph.Eur.) (E218) und Propyl-4-hydroxybenzoat (Ph.Eur.) (E216). Dobendan Direkt enthält: Levomenthol, Sucrose, Glucose, Honig. Dobendan Direkt Zuckerrfrei enthält: Levomenthol, Maltitol-Lösung, Isomalt. **Packungsbeilage beachten.**

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

DOBD0065

Reckitt Benckiser Deutschland GmbH – 69067 Heidelberg