

Fachinformation: Dobendan Direkt Flurbiprofen Spray 8,75 mg/Dosis Spray zur Anwendung in der Mundhöhle, Lösung, Januar 2015

Fachinformation: Dobendan Direkt Flurbiprofen 8,75 mg Lutschtabletten, Januar 2015

Fachinformation: Dobendan Direkt Zuckerfrei Flurbiprofen 8,75 mg Lutschtabletten, Januar 2015

Fachinformation: Dolo-Dobendan 1,4 mg / 10 mg Lutschtabletten. Stand: November 2016

Fachinformation: Dobensana Zuckerfrei Zitronengeschmack 1,2 mg / 0,6 mg Lutschtabletten Stand: Nov. 2015

Fachinformation: Dobensana Honig- und Zitronengeschmack 1,2 mg / 0,6 mg Lutschtabletten Stand: Juli 2016

Fachinformation: Dobensana Junior 1,2 mg / 0,6 mg Lutschtabletten Stand: Juli 2016.

Basistext für Werbung außerhalb der Fachkreise – Für Homepage

Dobendan® Direkt Flurbiprofen Spray 8,75 mg/Dosis Spray zur Anwendung in der Mundhöhle, Lösung

Anwendungsgebiete: Zur kurzzeitigen symptomatischen Behandlung von akuten Halsschmerzen bei Erwachsenen. **Enthält:** Methyl-4-hydroxybenzoat (Ph.Eur.) (E218) und Propyl-4-hydroxybenzoat (Ph.Eur.) (E216).

Dobendan® Direkt Flurbiprofen 8,75 mg Lutschtabletten

Anwendungsgebiete: Zur kurzzeitigen symptomatischen Behandlung bei schmerzhaften Entzündungen der Rachenschleimhaut bei Erwachsenen und Kindern ab 12 Jahren. **Enthält:** Levomenthol, Sucrose, Glucose und Honig.

Dobendan® Direkt Zuckerfrei Flurbiprofen 8,75 mg Lutschtabletten

Anwendungsgebiete: Zur kurzzeitigen symptomatischen Behandlung bei schmerzhaften Entzündungen der Rachenschleimhaut bei Erwachsenen und Kindern ab 12 Jahren. **Enthält:** Levomenthol, Maltitol-Lösung, Isomalt.

Dolo-Dobendan® 1,4 mg/10 mg Lutschtabletten

Wirkstoffe: Cetylpyridiniumchlorid, Benzocain

Anwendungsgebiete: Zur temporären unterstützenden Behandlung bei schmerzhaften Entzündungen der Mundschleimhaut und der Rachenschleimhaut. **Enthält:** Sorbitol, Sucrose (Zucker) und Glucose.

Dobensana® Zuckerfrei Zitronengeschmack 1,2 mg / 0,6 mg Lutschtabletten

Wirkstoffe: 2,4-Dichlorbenzylalkohol, Amylmetacresol

Anwendungsgebiete: Zur unterstützenden Behandlung bei Entzündungen der Rachenschleimhaut, die mit typischen Symptomen wie Halsschmerzen, Rötung oder Schwellung einhergehen. **Enthält:** Maltitol und Isomalt (Ph.Eur.).

Dobensana® Honig- und Zitronengeschmack 1,2 mg / 0,6 mg Lutschtabletten

Wirkstoffe: 2,4-Dichlorbenzylalkohol, Amylmetacresol

Anwendungsgebiete: Zur unterstützenden Behandlung bei Entzündungen der Rachenschleimhaut, die mit typischen Symptomen wie Halsschmerzen, Rötung oder Schwellung einhergehen. **Enthält:** Menthol, Glucose, Sucrose (Zucker) und Honig (Invertzucker).

Fachinformation: Dobendan Direkt Flurbiprofen Spray 8,75 mg/Dosis Spray zur Anwendung in der Mundhöhle, Lösung, Januar 2015

Fachinformation: Dobendan Direkt Flurbiprofen 8,75 mg Lutschtabletten, Januar 2015

Fachinformation: Dobendan Direkt Zuckerrfrei Flurbiprofen 8,75 mg Lutschtabletten, Januar 2015

Fachinformation: Dolo-Dobendan 1,4 mg / 10 mg Lutschtabletten. Stand: November 2016

Fachinformation: Dobensana Zuckerrfrei Zitronengeschmack 1,2 mg/ 0,6 mg Lutschtabletten Stand: Nov. 2015

Fachinformation: Dobensana Honig- und Zitronengeschmack 1,2 mg / 0,6 mg Lutschtabletten Stand: Juli 2016

Fachinformation: Dobensana Junior 1,2 mg/ 0,6 mg Lutschtabletten Stand: Juli 2016.

Dobensana® Junior 1,2 mg / 0,6 mg Lutschtabletten

Wirkstoffe: 2,4-Dichlorbenzylalkohol, Amylmetacresol

Anwendungsgebiete: Zur unterstützenden Behandlung bei Entzündungen der Rachenschleimhaut, die mit typischen Symptomen wie Halsschmerzen, Rötung oder Schwellung einhergehen. **Enthält:** Maltitol und Isomalt (Ph.Eur.).

Packungsbeilage beachten.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Reckitt Benckiser Deutschland GmbH – 69067 Heidelberg