

Nurofen Junior 60 mg Zäpfchen  
Nurofen Junior 125 mg Zäpfchen  
Nurofen Junior Fiebersaft Orange 20 mg/ml Suspension zum Einnehmen  
Nurofen Junior Fiebersaft Erdbeer 20 mg/ml Suspension zum Einnehmen  
Nurofen Junior Fieber - und Schmerzsaft Orange 40 mg/ml Suspension zum Einnehmen  
Nurofen Junior Fieber - und Schmerzsaft Erdbeer 40 mg/ml Suspension zum Einnehmen  
Nurofen 200 mg Schmelztabletten Lemon  
Nurofen 200 mg Schmelztabletten Mint  
Nurofen Immedia 200 mg Weichkapseln  
Nurofen Immedia 400 mg Filmtabletten  
Nurofen Ibuprofen 400 mg überzogene Tabletten

**Wirkstoff:** Ibuprofen

**Anwendungsgebiete:** Alle: Kurzzeit. symptomat. Behandlung leichter bis mäßig starker Schmerzen, Fieber; überzogene Tabl. zusätzlich: akute Kopfschmerzphase bei Migräne mit und ohne Aura, Spannungskopfschmerzen.  
**Warnhinweise:** Bei Schmerzen oder Fieber ohne ärztlichen Rat nicht länger anwenden als in der Packungsbeilage vorgegeben! Alle Susp.: enthält Maltitol und Natrium; 2% Susp. Orange zusätzl.: Glycerol; 2% Susp. Erdbeer zusätzl.: Glycerol und Propylenglycol; 4% Susp. Orange zusätzl.: Orangenaroma (enth. Weizenstärke); 4% Susp. Erdbeer zusätzl.: Erbeeraroma (enth. Propylenglycol); Schmelztabl. Lemon: enthält Aspartam und Natrium; Schmelztabl. Mint: enthält Aspartam, Sorbitol und Natrium; Weichkapseln: enthält Sorbitol und Ponceau 4R (E124); überzog. Tabl: enthält Sucrose und Natrium.

**Nurofen 24-Stunden Schmerzpflaster 200 mg wirkstoffhaltiges Pflaster**

**Wirkstoff:** Ibuprofen

**Anwendungsgebiete:** Kurzzeitige, symptomat. Behandlung von lokalen Schmerzen bei akuten Muskelzerrungen und in der Nähe der Gelenke verstauchter Gliedmaßen nach einem stumpfen Trauma bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 16 Jahren.

**Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.**

NURFD\_0253

Reckitt Benckiser Deutschland GmbH – 69067 Heidelberg

**Dobendan Direkt Lutschtabletten und Dobendan Direkt Spray** enthalten 8,75mg Flurbiprofen pro Einzeldosis. Nicht mehr als 5 Einzeldosen à 8,75 mg Flurbiprofen in einem Zeitraum von 24 Stunden anwenden.

**Dobendan® Direkt Flurbiprofen Spray 8,75 mg/Dosis Spray** zur Anwendung in der Mundhöhle, Lösung  
**Anwendungsgebiete:** Zur kurzzeitigen symptomatischen Behandlung von akuten Halsschmerzen bei Erwachsenen. Enthält Methyl-4-hydroxybenzoat (Ph.Eur.) (E218) und Propyl-4-hydroxybenzoat (Ph.Eur.) (E216).

**Dobendan® Direkt Flurbiprofen Spray Honig-und Zitronengeschmack 8,75 mg/Dosis Spray** zur Anwendung in der Mundhöhle, Lösung

**Anwendungsgebiete:** Zur kurzzeitigen symptomatischen Behandlung von akuten Halsschmerzen bei Erwachsenen. Enthält Methyl-4-hydroxybenzoat (Ph.Eur.) (E218) und Propyl-4-hydroxybenzoat (Ph.Eur.) (E216).

**Dobendan® Direkt Zuckerrfrei Flurbiprofen 8,75 mg Lutschtabletten**

**Anwendungsgebiete:** Zur kurzzeitigen symptomatischen Behandlung bei schmerzhaften Entzündungen der Rachenschleimhaut bei Erwachsenen und Kindern ab 12 Jahren. Enthält Levomenthol, Maltitol-Lösung, Isomalt.

### **Dobendan® Direkt Flurbiprofen 8,75 mg Lutschtabletten**

**Anwendungsgebiete:** Zur kurzzeitigen symptomatischen Behandlung bei schmerzhaften Entzündungen der Rachenschleimhaut bei Erwachsenen und Kindern ab 12 Jahren. Enthält Levomenthol, Sucrose, Glucose und Honig.

### **Dolo-Dobendan® 1,4 mg/10 mg Lutschtabletten**

**Wirkstoffe:** Cetylpyridiniumchlorid, Benzocain

**Anwendungsgebiete:** Zur temporären unterstützenden Behandlung bei schmerzhaften Entzündungen der Mundschleimhaut und der Rachenschleimhaut. Enthält Sorbitol, Sucrose (Zucker) und Glucose.

### **Dobensana® Zuckerfrei Zitronengeschmack 1,2 mg / 0,6 mg Lutschtabletten**

**Wirkstoffe:** 2,4-Dichlorbenzylalkohol, Amylmetacresol

**Anwendungsgebiete:** Zur unterstützenden Behandlung bei Entzündungen der Rachenschleimhaut, die mit typischen Symptomen wie Halsschmerzen, Rötung oder Schwellung einhergehen. Enthält Maltitol und Isomalt (Ph. Eur.).

### **Dobensana® Honig- und Zitronengeschmack 1,2 mg / 0,6 mg Lutschtabletten**

**Wirkstoffe:** 2,4-Dichlorbenzylalkohol, Amylmetacresol

**Anwendungsgebiete:** Zur unterstützenden Behandlung bei Entzündungen der Rachenschleimhaut, die mit typischen Symptomen wie Halsschmerzen, Rötung oder Schwellung einhergehen. Enthält Menthol, Glucose, Sucrose (Zucker) und Honig (Invertzucker).

### **Dobensana® Junior 1,2 mg / 0,6 mg Lutschtabletten**

**Wirkstoffe:** 2,4-Dichlorbenzylalkohol, Amylmetacresol

**Anwendungsgebiete:** Zur unterstützenden Behandlung bei Entzündungen der Rachenschleimhaut, die mit typischen Symptomen wie Halsschmerzen, Rötung oder Schwellung einhergehen. Enthält Maltitol und Isomalt (Ph. Eur.).

### **Dobensana Orangengeschmack 1,2 mg/ 0,6 mg Lutschtabletten**

**Wirkstoffe:** 2,4-Dichlorbenzylalkohol, Amylmetacresol

**Anwendungsgebiete:** Zur unterstützenden Behandlung bei Entzündungen der Rachenschleimhaut, die mit typischen Symptomen wie Halsschmerzen, Rötung oder Schwellung einhergehen.

**Warnhinweise:** Enthält Levomenthol, Sucrose (Zucker), Glucose. Packungsbeilage beachten. **Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.**

Packungsbeilage beachten.

**Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.**