

Fachinformation: **Dobendan Direkt Flurbiprofen Spray 8,75 mg/Dosis Spray zur Anwendung in der Mundhöhle, Lösung.**

Fachinformation: **Dobendan Direkt Flurbiprofen 8,75 mg Lutschtabletten.**

Stand: **Januar 2015.**

Basistext für Werbung außerhalb der Fachkreise

Dobendan Direkt Flurbiprofen Spray 8,75 mg/Dosis Spray zur Anwendung in der Mundhöhle, Lösung

Dobendan® Direkt Flurbiprofen 8,75 mg Lutschtabletten

Wirkstoff: Flurbiprofen

Anwendungsgebiete: *Dobendan Direkt Spray:* zur kurzzeitigen symptomatischen Behandlung von akuten Halsschmerzen bei Erwachsenen. *Dobendan Direkt Lutschtabletten:* zur kurzzeitigen symptomatischen Behandlung bei schmerz. Entzündungen der Rachenschleimhaut bei Erwachsenen und Kindern ab 12 Jahren. **Warnhinweise:** *Dobendan Direkt Spray* enthält: Methyl-4-hydroxybenzoat (Ph.Eur.) (E218) und Propyl-4-hydroxybenzoat (Ph.Eur.) (E216). *Dobendan Direkt Lutschtabletten* enthält: Levomenthol, Sucrose, Glucose und Honig. **Packungsbeilage beachten. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.**

DOBD0063

Reckitt Benckiser Deutschland GmbH – 69067 Heidelberg