

Pflichttexte

Venostasin® retard 50 mg Hartkapsel, retardiert

Wirkstoff: Rosskastaniensamen-Trockenextrakt. Anwendungsgebiet: Bei Erwachsenen zur Behandlung v. Beschwerden bei Erkrankungen der Beinvenen (chronische Veneninsuffizienz), z.B. Schmerzen u. Schweregefühl i. d. Beinen, nächtliche Wadenkrämpfe, Juckreiz u. Ödeme. Warnhinweise: Arzneimittel f. Kinder unzugängl. aufbewahren. Stand: 04/17-2

Venostasin® Creme

Wirkstoff: Rosskastaniensamen-Trockenextrakt. Anwendungsgebiet: Traditionelles pflanzl. Arzneimittel zur Anwend. bei Erwachsenen zur Besserung des Befindens bei müden Beinen ausschließlich auf Grund langjähriger Anwendung. Warnhinweise: Enthält u.a. Zimtaldehyd, Methyl-4-hydroxybenzoat (Ph.Eur.), Propyl-4-hydroxybenzoat (Ph.Eur.), Butylhydroxytoluol (Ph.Eur.), emulgierenden Cetylstearylalkohol (Typ A) (DAB), Polysorbat 65, Sorbinsäure (Ph.Eur.), Benzoesäure u. Benzoate. Arzneimittel f. Kinder unzugängl. aufbewahren. Stand: 03/22-2.

Venostasin®-Gel Aescin 1g/100g Gel

Wirkstoff: Aescin. Anwendungsgebiet: Traditionell angewendet zur Besserung des Befindens bei müden Beinen ausschließlich auf Grund langjähriger Anwendung. Warnhinweise: Enthält Propylenglycol. Arzneimittel f. Kinder unzugängl. aufbewahren. Stand: 04/17-2.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.