

# Gebrauchsinformation: Information für Anwender

# **neo-angin**<sup>®</sup>

## HALSTABLETTEN

Zur Anwendung bei Erwachsenen und Kindern ab 6 Jahren

Wirkstoffe in einer Lutschtablette: 2,4-Dichlorbenzylalkohol 1,2 mg; Amylmetacresol 0,6 mg; Levomenthol 5,9 mg

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 3 - 4 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

### Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was sind neo-angin<sup>®</sup> Halstabletten und wofür werden sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von neo-angin<sup>®</sup> Halstabletten beachten?
3. Wie sind neo-angin<sup>®</sup> Halstabletten anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind neo-angin<sup>®</sup> Halstabletten aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### 1. Was sind neo-angin<sup>®</sup> Halstabletten und wofür werden sie angewendet?

neo-angin<sup>®</sup> Halstabletten sind ein Mund- und Rachentherapeutikum.

**Anwendungsgebiet:** Zur unterstützenden Behandlung bei Entzündungen der Rachenschleimhaut, die mit typischen Symptomen wie Halsschmerzen, Rötung oder Schwellung einhergehen.

Zur Anwendung bei Erwachsenen und Kindern ab 6 Jahren.

#### 2. Was sollten Sie vor der Anwendung von neo-angin<sup>®</sup> Halstabletten beachten?

**neo-angin<sup>®</sup> Halstabletten dürfen nicht angewendet werden,**

- wenn Sie allergisch gegen 2,4-Dichlorbenzylalkohol, Amylmetacresol, Levomenthol oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind,
- bei Säuglingen und Kindern bis zu 2 Jahren (Levomenthol).

#### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie neo-angin<sup>®</sup> Halstabletten anwenden. Bei Fieber, bakterieller Halsentzündung und/oder Verschlechterung des Allgemeinzustandes ist sofort ärztlicher Rat einzuholen, da gegebenenfalls eine systemische Antibiotikagabe erforderlich ist.

#### **Kinder**

Bei der Anwendung an Kindern ist zu beachten, dass diese die Fähigkeit zu kontrolliertem Lutschen erworben haben müssen.

#### **Anwendung von neo-angin<sup>®</sup> Halstabletten zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben, oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt. Wechselwirkungen sind nicht bekannt.

#### **Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit**

Es liegen keine Daten über die Verträglichkeit von neo-angin<sup>®</sup> Halstabletten in der Schwangerschaft und Stillzeit vor. neo-angin<sup>®</sup> Halstabletten sollten in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden. Es liegen keine Studien zur Untersuchung der Auswirkungen auf die Fortpflanzungsfähigkeit am Menschen vor.

#### **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

neo-angin<sup>®</sup> Halstabletten haben keinen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

#### **neo-angin<sup>®</sup> Halstabletten enthalten Ponceau 4R (E 124), Glucose und Saccharose**

Ponceau 4R (E 124) kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Bitte nehmen Sie neo-angin<sup>®</sup> Halstabletten erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden. 1 Lutschtablette enthält 1,14 g Glucose und 1,42 g Saccharose (Zucker). Wenn Sie eine Diabetes-Diät einhalten müssen, sollten Sie dies berücksichtigen.

neo-angin<sup>®</sup> Halstabletten können schädlich für die Zähne sein (Karies).

Schwefeldioxid (E 220; enthalten im Glucose-Sirup) kann selten schwere Überempfindlichkeitsreaktionen und eine Verkrampfung der Atemwege (Bronchospasmen) hervorrufen.

#### **neo-angin<sup>®</sup> Halstabletten enthalten Pfefferminzöl**

Bei entsprechend sensibilisierten Patienten können durch Pfefferminzöl Überempfindlichkeitsreaktionen (einschließlich Atemnot) ausgelöst werden.



