

## **GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER**

### **Homvio-Em<sup>®</sup>, 50 Tabletten**

Wirkstoffe: Apomorphinum hydrochloricum Trit. D3,  
Cocculus Trit. D3

**Lesen Sie bitte die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

**Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Homvio-Em<sup>®</sup> jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

#### **Diese Packungsbeilage beinhaltet:**

1. Was ist Homvio-Em<sup>®</sup> und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Homvio-Em<sup>®</sup> beachten?
3. Wie ist Homvio-Em<sup>®</sup> einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Homvio-Em<sup>®</sup> aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

#### **1. WAS IST HOMVIO-EM<sup>®</sup> UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?**

Homvio-Em<sup>®</sup> ist ein homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen der Verdauungsorgane.

#### **Anwendungsgebiete**

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Erbrechen verschiedener Ursache.

## **2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON HOMVIO-EM® BEACHTEN?**

### **Homvio-Em® darf nicht eingenommen werden,**

- bei Kindern unter 1 Jahr
- Kleinkinder unter 6 Jahren sind in jedem Fall von einer Selbstmedikation auszuschließen.

Siehe unter „Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise“.

### **Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Homvio-Em® ist erforderlich:**

- Wenn Übelkeit oder Erbrechen länger als zwei Tage anhalten und/oder mit Temperaturerhöhungen und mit großem Flüssigkeitsverlust einhergehen, die eine Austrocknung des Körpers (Dehydratation) befürchten lassen, sollte ein Arzt aufgesucht werden.
- Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie Homvio-Em® erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

### **Bei Einnahme von Homvio-Em® mit anderen Arzneimitteln**

Bei Homvio-Em® sind bisher keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt geworden.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor Kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

### **Bei Einnahme von Homvio-Em® zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken**

Allgemeiner Hinweis:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

### **Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?**

Die Anwendung des Arzneimittels bei Kleinkindern unter 6 Jahren darf nicht ohne ärztlichen Rat erfolgen und ersetzt nicht andere vom Arzt verordnete Arzneimittel.

### **Was ist bei älteren Menschen zu berücksichtigen?**

Auch ältere Menschen können Homvio-Em® unbedenklich einnehmen.

## **Schwangerschaft und Stillzeit**

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, darf das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

### **3. WIE IST HOMVIO-EM® EINZUNEHMEN?**

Nehmen Sie Homvio-Em® immer genau nach der Anweisung in dieser Gebrauchsinformation ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

#### **Dosierung**

Soweit nicht anders verordnet:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6-mal täglich je 1 Tablette einnehmen.

Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1- bis 3-mal täglich je 1 Tablette einnehmen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Die Dosierung bei Kleinkindern erfolgt durch den Arzt. Kinder zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr erhalten nicht mehr als zwei Drittel der Erwachsenenendosis.

#### **Wie sollten Sie Homvio-Em® einnehmen?**

Zur Verbesserung der Wirksamkeit sollte man die Tabletten im Mund zergehen lassen.

#### **Wie lange sollten Sie Homvio-Em® einnehmen?**

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

### **4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

Wie alle Arzneimittel kann Homvio-Em® Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt.

**H i n w e i s:**

Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesinstitut für Arzneimittel  
und Medizinprodukte  
Abt. Pharmakovigilanz  
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3  
D-53175 Bonn  
Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de)

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

## **5. WIE IST HOMVIO-EM® AUFZUBEWAHREN?**

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Das Verfalldatum ist auf der äußeren Umhüllung und dem Blister aufgedruckt („Verwendbar bis“). Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum.

Nicht über 25 °C lagern.

## **6. WEITERE INFORMATIONEN**

### **Was Homvio-Em® Tabletten enthalten:**

1 Tablette zu 320 mg enthält:

Wirkstoffe:

Apomorphinum hydrochloricum Trit. D3	32,0 mg
Cocculus Trit. D3	64,0 mg

Sonstige Bestandteile: Lactose-Monohydrat, Maisstärke, Magnesiumstearat

### **Wie Homvio-Em® Tabletten aussehen und Inhalt der Packung**

Homvio-Em® sind weiße, runde Tabletten. Die Tabletten sind in Blistern zu 25 Stück in einer Faltschachtel verpackt.

Packungsgröße: 50 Tabletten

### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:**

GI 2017-11-17

Pharmazeutischer Unternehmer:  
Homviora Arzneimittel  
Dr. Hagedorn GmbH & Co.  
Arabellastraße 5  
D-81925 München  
Tel. +49 89 921 994 30  
[info@homviora.de](mailto:info@homviora.de)

Hersteller:  
Mauermann-Arzneimittel KG  
Heinrich-Knote-Straße 2  
D-82343 Pöcking

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet 11/2017**