

## Gebrauchsinformation

# **Solidago-** *logoplex*<sup>®</sup>

Flüssige Verdünnung zur Injektion

Homöopathisches Arzneimittel  
Für Tiere

Pferde, Rinder, Schweine, Schafe,  
Ziegen, Hunde, Katzen

### **Zusammensetzung:**

100g (=100ml) Flüssige Verdünnung zu Injektion enthalten:  
Wirkstoffe: Solidago virgaurea Dil. D4 5,0g, Aconitum  
napellus Dil. D8 5,0g, Atropa bella-donna Dil. D6 5,0g,  
Eupatorium purpureum Dil. D6 5,0g, Solanum dulcamara  
Dil. D4 5,0g, Spigelia anthelmia Dil. D4 5,0g.  
Sonstige Bestandteile:  
Natriumchlorid, Wasser für Injektionszwecke.

### **Darreichungsform und Inhalt:**

Flüssige Verdünnung zur Injektion, 20 ml.

### **Pharmazeutischer Unternehmer:**

FRANZ ZIEGLER GmbH,  
Ötzer Str. 10, 86672 Thierhaupten,  
Telefon: 08271-813111, Telefax: 08271-813112.

### **Anwendungsgebiete:**

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne  
Angabe einer therapeutischen Indikation. Vor der  
Anwendung sollte eine tierärztliche Untersuchung erfolgen.

### **Wechselwirkungen:**

Wie bei allen Arzneimitteln können auch bei homöopathi-  
schen Arzneimitteln Wechselwirkungen mit anderen  
Arzneimitteln auftreten. Wenn **Solidago-logoplex**<sup>®</sup> gleich-  
zeitig mit einem anderen Arzneimittel angewendet werden  
soll, fragen Sie dazu Ihren Tierarzt.

### **Gegenanzeigen:**

Keine bekannt.

### **Anwendung während der Trächtigkeit und Laktation:**

Zur Verträglichkeit von **Solidago-logoplex**<sup>®</sup> bei trächtigen  
und laktierenden Tieren liegen keine Untersuchungsergeb-  
nisse vor. Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische  
Arzneimittel während der Trächtigkeit und Laktation nur  
nach Rücksprache mit dem Tierarzt angewendet werden.

## **Nebenwirkungen:**

Hinweis: Bei der Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Tierarzt befragen. Falls Sie eine Nebenwirkung bei Ihrem Tier / Ihren Tieren feststellen, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt ist, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

## **Dosierung für jede Tierart, Art und Dauer der Anwendung:**

Vor Entnahme gut durchschütteln. Zur subkutanen Injektion. Entsprechend Tierart und Körpergewicht beträgt die Einzeldosis:

Pferd, Rind . . . . . 10 ml

Kalb, Schwein . . . . . 5 ml

Ferkel, Schaf, Ziege . . . . . 2–3 ml

Hund, Katze jeweils pro kg KGW. . . . . 0,2 ml

Für einen Hund mit einem Körpergewicht von 10 kg beträgt das maximale Injektionsvolumen 3 ml, für eine Katze 1 ml.

Je nach Schwere der Erkrankung und Krankheitsverlauf Verabreichung der Einzeldosis 1–2 mal täglich über 2–3 Tage. Nicht länger als bis zur vollständigen Heilung des Tieres.

## **Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:**

Eine Injektion dieses Arzneimittels sollte nur von Tierärzten oder anderen Personen durchgeführt werden, die die jeweilige Injektionstechnik sicher beherrschen. Unsachgemäß durchgeführte Injektionen können zu bleibenden Schäden bis hin zu lebensbedrohlichen Zuständen führen. Nach der Applikation ist das Tier über einen angemessenen Zeitraum zu beobachten, um bei Anzeichen einer anaphylaktischen Reaktion sofort therapeutische Maßnahmen ergreifen zu können. Bei anhaltenden, unklaren, periodisch oder neu auftretenden Beschwerden, Fieber oder schweren Störungen des Allgemeinbefindens sollte umgehend ein Tierarzt aufgesucht werden.

## **Wartezeit:**

Pferd, Rind, Schwein, Schaf, Ziege

Essbare Gewebe . . . . . 0 Tage

Pferd, Rind, Schaf, Ziege

Milch . . . . . 0 Tage

## **Besondere Lagerungshinweise:**

Das Arzneimittel nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfallsdatums nicht mehr verwenden. Nicht über 25°C lagern. Nicht konserviert. Nach Anbruch in der Flasche verbleibende Reste sind zu verworfen. Konsequente Kühlung und sterile Entnahme sind wichtige Bestandteile der sachgerechten Handhabung. Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

## **Genehmigungsdatum der Packungsbeilage:**

März 2010 – Apothekenpflichtig!

## **Hinweise für Anwender:**

ZIEGLER Kombinationsarzneimittel bestehen aus natürlichen Vorkommen des pflanzlichen, tierischen und mineralischen Bereichs. In der vet.-hom. Literatur werden die Bestandteile dieses Arzneimittels u.a. beschrieben bei: Akute und chronische Erkrankungen der Nieren und Harnwege.

## **Handelsform:**

Originalpackung mit 5 Flaschen á 20 ml flüssiger Verdünnung zur Injektion.