

# Acetocastin® Warzenmittel

Flasche mit Sicherheitsverschluss, gefüllt mit 2ml Lösung aus Monochloressigsäure und gereinigtem Wasser. Der Spatel im Flaschendeckel wird verwendet, um die Lösung auf die Warze aufzutragen.

## Anwendungshinweise:

**Bitte lesen Sie vor der Anwendung die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, selbst wenn Sie Acetocastin® Warzenmittel bereits zuvor verwendet haben. Die Informationen können sich aufgrund neuer Forschungsergebnisse und Erkenntnisse seit der letzten Verwendung geändert haben. Acetocastin® Warzenmittel kann ohne Rezept erworben werden. Trotzdem sollten Sie bei der Anwendung von Acetocastin® Warzenmittel sorgsam und vorsichtig sein, um ein sicheres und gutes Ergebnis zu erzielen. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung auf, falls Sie sie erneut lesen möchten.**

### Diese Anleitung enthält:

1. Was ist Acetocastin® Warzenmittel und wofür wird es verwendet?
2. Was müssen Sie wissen, bevor Sie Acetocastin® Warzenmittel verwenden?
3. Wie wird Acetocastin® Warzenmittel verwendet?
4. Vorsichtsmaßnahmen
5. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
6. Wie sollte Acetocastin® Warzenmittel gelagert werden?

### 1. Was ist Acetocastin® Warzenmittel und wofür wird es verwendet?

Acetocastin® Warzenmittel ist ein Medizinprodukt zur Behandlung von gewöhnlichen Warzen und Dornwarzen. Acetocastin® Warzenmittel enthält Monochloressigsäure, eine Substanz die eine keratolytische (ablösende) Wirkung auf die Haut hat. Die Warze wird Schicht für Schicht aufgelöst. Monochloressigsäure sorgt dafür, dass die Zellen, die das Warzenvirus enthalten, zerstört werden. Der Vorteil bei der Verwendung von Acetocastin® Warzenmittel ist, dass die Anwendung direkt auf der Warze nicht schmerzhaft ist, was bedeutet, dass es auch bei Kindern angewendet werden kann, wenn es von einem Erwachsenen richtig aufgetragen wird.

### 2. Was müssen Sie wissen, bevor Sie Acetocastin® Warzenmittel verwenden?

Das Acetocastin® Warzenmittel darf nur bei gewöhnlichen Warzen (verruca vulgaris) angewendet werden, Diese erkennt man hieran:



- Treten hauptsächlich an Händen und Füßen auf.
- Haben die gleiche Farbe wie die Haut.
- Die Größe liegt zwischen weniger als einem Millimeter bis zu mehr als einem Zentimeter.
- Meist treten mehrere Warzen gleichzeitig auf.
- Die Ansteckung erfolgt meist durch direkten Kontakt, kann aber auch über Handtücher oder infizierte Oberflächen erfolgen.
- Kratzen und Nägelkauen erhöhen das Risiko einer Infektion.



### Verwenden Sie Acetocastin® Warzenmittel nicht bei Alterswarzen.

Diese erkennt man hieran:

- Können unterschiedliche Größen und Farben haben.
- Die durchschnittliche Größe liegt bei 0,5 bis 1 cm.
- Sie beginnen oft als hautfarbene, gelbbraune oder graubraune Flecken. Werden später größer und dicker.
- Sie machen den Eindruck, als würden sie auf der Oberfläche der Haut liegen und leicht abkratztbar sein, sind jedoch tatsächlich fest mit der Haut verbunden.
- Sie können überall am Körper auftreten, außer in den Handflächen, auf Fußsohlen und Lippen. Alterswarzen treten am wahrscheinlichsten auf der Brust, dem Rücken, im Gesicht und am Hals auf.



### 3. Wie wird Acetocastin® Warzenmittel verwendet?

Bitte tragen Sie Acetocastin® Warzenmittel äußerst vorsichtig mit dem Spatel im Verschluss auf. Die Lösung ist äußerst ätzend. Seien Sie besonders vorsichtig bei eingeschränkter Mobilität oder bei gestörter Feinmotorik (zitternde Hände, steife Finger). Schließen Sie die Flasche nach der Anwendung sorgfältig. Acetocastin® Warzenmittel sollte nicht häufiger als einmal pro Woche angewendet werden. Abhängig von der Größe und Dicke der Warze kann es notwendig sein, die Behandlung nach einer Woche zu wiederholen. Warzen sind ansteckend, daher wird die Anwendung derselben Flasche von Acetocastin® Warzenmittel bei mehreren Personen nicht empfohlen.

1. Vermeiden Sie den Kontakt mit Kleidung, Textilien und Tischdecken. Tragen Sie vor dem Öffnen der Flasche großzügig Vaseline oder Zinksalbe auf die gesunde Haut um die Warze herum auf.
2. Acetocastin® Warzenmittel verfügt über einen kindersichereren Verschluss, der wie folgt geöffnet werden kann: Platzieren Sie die Flasche auf einer stabilen Oberfläche, die ätzende Flüssigkeit verträgt. Sie können die Flasche öffnen, indem Sie den Verschluss nach unten drücken und gleichzeitig gegen den Uhrzeigersinn drehen. Entfernen Sie so den Verschluss von der Flasche.
3. Tragen Sie nun eine kleine Menge der Lösung mit dem Spatel auf die Warze auf (lassen Sie die Flüssigkeit nicht troffen). Stellen Sie sicher, dass Sie die Lösung nur auf die Warze auftragen und die Warze dabei nicht mehrmals abtupfen.
4. Lassen Sie die Lösung einen Moment lang trocknen und bedecken Sie die Warze nicht.
5. Schließen Sie die Flasche nach der Anwendung sorgfältig. Die Flüssigkeit benötigt ungefähr eine Woche, um die obere Schicht der Warze aufzulösen, daher werden Sie nach der Anwendung kein sofortiges Ergebnis sehen.

### 4. Vorsichtsmaßnahmen

Verwenden Sie Acetocastin® Warzenmittel nicht:

- Bei Kindern unter 4 Jahren.
- Wenn Sie gegen eine oder mehrere der Inhaltsstoffe allergisch sind.
- Im Gesicht (die Flüssigkeit sollte niemals mit den Augen oder den Schleimhäuten von Nase oder Mund in Kontakt kommen).
- Bei Genitalwarzen oder im Genitalbereich.
- Auf Muttermalen, Mollusca contagiosa, offenen Wunden, Leberflecken, Naevi, Alterswarzen (braune Warzen), dunkel gefärbten, behaarten oder seltsam aussehenden Warzen.
- Auf roten, gereizten oder infizierten Warzen.
- Unmittelbar nach einer operativen Entfernung von Warzen, Vereingung von Warzen (Kryotherapie) oder einer Laserbehandlung. Dies gilt insbesondere, wenn die Haut nach der Behandlung rot oder schmerzhaft ist. In diesem Fall müssen Sie mindestens 4 Wochen warten, bis die Rötung oder Entzündung der Haut vollständig verschwunden ist. Erst dann können Sie die Behandlung mit Acetocastin® Warzenmittel beginnen.
- Während einer Schwangerschaft oder während der Stillzeit.
- Nicht auf Warzen anwenden, die vollständig oder teilweise unter dem Nagel auftreten.

### Seien Sie besonders vorsichtig bei der Verwendung von Acetocastin® Warzenmittel:

- Im Zweifelsfall bezüglich der Diagnose (wenn die Veränderung der Haut nicht eindeutig als Warze identifiziert werden kann).
- Im Falle einer Immunschwäche (z. B. wenn Sie Zytostatika-Medikamente verwenden).
- Im Falle von Diabetes oder anderen Beschwerden wie Gefäßerkrankungen, aufgrund derer Wunden schlechter heilen.
- In diesen Fällen dürfen Sie Acetocastin® Warzenmittel erst nach Rücksprache mit einem Arzt verwenden.

### ⚠️ Warnungen:

- Nur zur äußerlichen Anwendung bestimmt.
- Mit äußerster Vorsicht verwenden. Die Flüssigkeit des Acetocastin® Warzenmittels ist stark ätzend.
- Wenn gesunde Haut mit Acetocastin® Warzenmittel in Kontakt kommt, spülen Sie sie bitte mit Wasser ab. Wenn die Haut trotz dieser Vorsichtsmaßnahmen geschädigt wird, sollte sie wie eine Verbrennung behandelt werden.
- Konsultieren Sie Ihren Arzt, wenn Ihre Beschwerden nicht nachlassen.
- Verschließen Sie die Flasche nach Gebrauch sorgfältig und lagern Sie sie aufrecht.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Die Anwendung bei Kindern, älteren Menschen und Menschen mit sonstigen körperlichen und/oder geistigen Einschränkungen muss von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Kleidung, Textilien, Tischdecken oder gesunder Haut.
- Brechen Sie die Anwendung ab, wenn Blasen auftreten.

### 5. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

#### NEBENWIRKUNGEN

Acetocastin® Warzenmittel kann vereinzelt Nebenwirkungen verursachen, jedoch wird nicht jede diese Nebenwirkungen auch auftreten. Mögliche Nebenwirkungen bei der Verwendung von Acetocastin® Warzenmittel sind Reizungen der Haut, brennendes Gefühl, Hautrötung oder Überempfindlichkeitsreaktionen. Wenn eine dieser Nebenwirkungen schwerwiegend wird oder wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführt sind, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

#### WECHSELWIRKUNGEN MIT MEDIKAMENTEN

Nach aktuellem Kenntnisstand gibt es keine Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten.

#### INHALTSSTOFFE

Monochloressigsäure, Gereinigtes Wasser

#### INHALT

2ml-Flasche mit Spatel zum Auftragen  
Beipackzettel

### 6. Wie sollte Acetocastin® Warzenmittel gelagert werden?

Bewahren Sie Acetocastin® Warzenmittel bei einer Temperatur von 15-25°C an einem trockenen und dunklen Ort in der Originalverpackung und außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Das Verfallsdatum befindet sich auf der Unterseite der Verpackung. Nach dem Öffnen nicht länger als 6 Wochen verwenden. Alle Anfragen zu Acetocastin® Warzenmittel richten Sie bitte an das Vertriebsunternehmen.


**Medizinprodukt:** Acetocastin® Warzenmittel ist ein Medizinprodukt der Klasse IIa gemäß der Richtlinie 93/42/EWG.

Weitere Informationen finden Sie unter oder [www.acetocastin.de](http://www.acetocastin.de).



ANWENDUNG  
AUF HÄNDEN  
UND FÜSSEN  
NUR

2ml e



**PK Benelux B.V.**  
Vluchtoord 17  
5406 XP Uden  
Niederlande

**TheOTCLab**  
Fred. Roeskestraat 100  
1076 ED Amsterdam  
Niederlande