

# Onligol

## MACROGOL 4000


WIRKT ABFÜHREND

Bei Verstopfung

Mit Messlöffel



400 g



ALFASIGMA

**WIE ONLIGOL AUSSIEHT:** Onligol ist ein Abführmittel als Pulver für **Trinklösung** auf der Basis von **Macrogol 4000**.

Es enthält **keine Hilfsstoffe, Aromen oder Zucker**. Es kann in einem beliebigen Getränk aufgelöst werden: z.B. Tee, Kräutertee, Milch, Brühe oder Fruchtsaft und verändert den Geschmack nicht. Die Packung enthält 400 g Pulver mit einem Messlöffel. Onligol ist auch in einer 400-g-Flasche und in 10-g-Einwegbeuteln (Schachtel mit 20 Beuteln) erhältlich.

**WANN WIRD ONLIGOL ANGEWENDET?** Onligol wird insbesondere bei **chronischer Verstopfung** angewendet. Es wird auch bei gelegentlich auftretendem unregelmäßigem Stuhlgang angewendet.

**WIE WIRKT ONLIGOL?** Dank seiner Wasserbindung macht Onligol den Stuhl weicher, erleichtert dadurch die Entleerung, fördert das Wohlbefinden und schafft Erleichterung. Es entfaltet seine **Wirkung auf natürliche** Art und Weise:

- Es wird im Darm **nicht resorbiert** oder fermentiert

- Es **reizt nicht** die Schleimhaut

- Es wird unverändert mit dem Stuhl ausgeschieden

Es verursacht keine Krämpfe, Bauchschmerzen oder Stuhldrang.

Seine Wirksamkeit nimmt mit der Zeit nicht ab.

**WIE WIRD ONLIGOL ANGEWENDET?** Der Dose liegt ein Messlöffel bei. Lösen Sie die Dosis (siehe unten) in mindestens 150 ml eines beliebigen, auch heißen, Getränks wie Tee, Kräutertee, Milch, Brühe oder Fruchtsaft auf. Onligol verändert den Geschmack des Getränks nicht. Trinken Sie die hergestellte Lösung. Es wird empfohlen, Onligol zwischen den Mahlzeiten einzunehmen.

**DOSIERUNG:** (sofern vom Arzt nicht anders verordnet): Onligol erlaubt eine große Flexibilität bei der Dosierung.

**Erwachsene und Kinder mit einem Körpergewicht über 20 kg (11 Jahre):** Die Dosis ist 10 g (2 Messlöffel), 1-3 mal täglich, je nach individuellem Ansprechen. Um eine schnellere Wirkung zu erzielen, kann die maximale Tagesdosis von 30 g (6 Messlöffel) in einer einzigen Dosis eingenommen werden. Bei längerem Gebrauch kann die Dosis auf 10 g (2 Messlöffel) 1-2 mal täglich, auch jeden zweiten Tag, vorzugsweise abends, reduziert werden.

**Kinder bis 20 kg (11 Jahre):** Die übliche Anfangsdosis beträgt

Körpergewicht (kg)	Tagesdosis (g)	Anzahl der Messlöffel
6-9 kg (6 Monate - 1 Jahr)	5	1
10-12 kg (1-2 Jahre)	7,5	1 ½
13-16 kg (2-6 Jahre)	10	2
17-20 kg (6-11 Jahre)	12,5	2 ½

Bei Kindern unter 20 kg ist es ratsam, die Dosis dem tatsächlichen Bedarf des Kindes anzupassen, bis ein weicher Stuhlgang erreicht wird. **Die maximale Tagesdosis von 30 g (6 Messlöffel) darf nicht überschritten werden.**

**Wann darf Onligol nicht angewendet werden?** Onligol darf nicht eingenommen werden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Macrogol, Magen-Darm-Perforation und/oder -Obstruktion. In der Schwangerschaft und Stillzeit sollte das Produkt nur auf ärztliche Verordnung angewendet werden.

**Kann ich Onligol einnehmen, wenn ich Medikamente einnehme?** Ja, es sind keine Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten bekannt, aber es ist ratsam, das Produkt mindestens 2 Stunden nach der Einnahme von Medikamenten einzunehmen.

**Können unerwünschte Wirkungen auftreten?** Gelegentliche Blähungen und/oder Übelkeit, die bei fortgesetzter Einnahme abklingen. Seltene Fälle von allergischen Reaktionen (Hautausschlag, Nesselsucht): In diesem Fall müssen Sie die Einnahme des Arzneimittels abbrechen und Ihren Arzt oder Apotheker informieren.

**Was passiert im Falle einer Überdosierung?** Es kann zu Durchfall kommen, der nach Absetzen des Präparates spontan abklingt.

**WARNHINWEISE FÜR DIE ANWENDUNG:** In der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren. Das angegebene Verfalldatum bezieht sich auf das Produkt in ungeöffneter und vorschriftsgemäß gelagerter Verpackung. Verschließen Sie die Flasche nach Gebrauch fest. Nicht unter 6 Monaten verwenden. Während der Behandlung mit ONLIGOL ist es ratsam, eine angemessene Diät einzuhalten, begleitet von der Verabreichung einer oralen Rehydrationslösung (ORL), um eine Dehydrierung zu vermeiden; es ist jedoch ratsam, Ihren Arzt zu befragen. Verwenden Sie ONLIGOL nicht länger als 30 aufeinanderfolgende Tage; wenn die Symptome anhalten, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

**FÜR KINDER UNZUGÄNGLICH AUFBEWAHREN - OHNE ZUCKER**

Vertreiber: **ALFASIGMA GMBH**  
c/o Design Offices Macherei  
Weihenstephaner Straße 12  
81673 München

Hersteller: **SIIT Srl**  
Via Ariosto, 50/60  
20090 Trezzano s/N (MI)  
Italien



PZN - 19388337

03011626/1 45003391

