



## Sidroga® Bio Kinder-Hustentee



### Pflanzlicher Hustentee für Kinder

Wenn Kinder krank sind, vertrauen viele Mütter auf Arzneimittel mit rein pflanzlichen Inhaltsstoffen ohne Zusätze. Sidroga® Bio Kinder-Hustentee hilft mit einer Mischung aus wohltuenden Heilkräutern bei Entzündungen der Atemwege. Der Arzneitee wird bei der Behandlung von Bronchitis-Symptomen angewendet und lindert den Hustenreiz bei Katarrhen der oberen Atemwege mit trockenem Husten. Der wohlschmeckende Kinder-Hustentee enthält eine sorgfältig aufeinander abgestimmte Mischung aus Anis, Lindenblüten und Thymian. Das ätherische Öl, das in den Anisfrüchten und Thymianblättern enthalten ist, erleichtert das Abhusten, Lindenblüten besitzen durch ihren Gehalt an Schleimstoffen zudem eine hustenreizlindernde Wirkweise.

### Für Kinder ab 12 Monaten

- Bio-Qualität
- Ohne Zusatz von Zucker und Aromen

### 100% natürlich

Tee hat sich seit Jahrtausenden als wirksame Behandlungsmethode für viele Beschwerden bewährt. Basierend auf traditionellem Heilkräuterwissen und den neuesten Erkenntnissen moderner Phytotherapie entwickelt Sidroga® natürliche Arzneitees mit heilsamer Wirkung. Alle sorgsam aufeinander abgestimmten Bestandteile des Bio Kinder-Hustentees stammen von Arzneipflanzen aus biologischem Anbau, die behutsam mit Aromaschutzumbeutel versiegelt werden.

### ANWENDUNGSEMPFEHLUNG:

Kinder trinken abhängig vom Alter mehrmals täglich eine Tasse frisch zubereiteten Teeaufguss. Falls vom Arzt nicht anders verordnet, empfiehlt sich folgende Dosierung: Kinder von 1 bis 4 Jahren 2- bis 3 mal täglich eine Tasse, Kinder zwischen 4 und 10 Jahren 3- bis 4 mal täglich eine Tasse, Kinder ab 10 Jahren mehrmals täglich eine Tasse Sidroga® Bio Kinder-Hustentee.

Für den Teeaufguss 1 Filterbeutel Sidroga® Bio Kinder-Hustentee mit 150 ml siedendem Wasser übergießen, 10 Minuten ziehen lassen und den Beutel entnehmen.



### ARZNEITEE FÜR KINDER

Die Gewährleistung einer gleichbleibend hohen Qualität ist auch für Sidroga® Kindertees oberstes Gebot. Die Kräutertee-Mischungen stammen aus ökologischem Anbau (BIO) und sind speziell für die Bedürfnisse von Kindern zusammengestellt worden, ohne zusätzlichen Zucker oder Geschmacksverstärker. Die Kindertees sind gluten- und laktosefrei.

### OHNE ZUSATZ VON AROMEN

Der Qualitätsanspruch von Sidroga® Tees ist hoch und erfordert besonders bei Arzneitees für Kinder, eine Garantie für qualitativ hochwertige Inhaltsstoffe. Aus diesem Grund verzichtet Sidroga® auf Zucker und Aromen. Die Gewährleistung einer gesunden und ausgewogenen Ernährung steht an erster Stelle.

### GEPRÜFTE QUALITÄT

Arzneitees werden exakt geprüft und unterliegen strengen gesetzlichen Richtlinien und Qualitätsstandards, die unter anderem im Europäischen Arzneibuch festgehalten sind. Nur ein Tee, der die strengen behördlichen Vorgaben erfüllt, darf als Arzneitee verkauft werden.

### HÄUFIGE FRAGEN & ANTWORTEN

#### Sind lose Tees nicht qualitativ hochwertiger als Teebeutel ?

Nein, entscheidend ist immer, was im Teebeutel drin steckt. Für Sidroga® -Arzneitees wird bewusst der sogenannte Feinschnitt verwendet. Dabei wird die Heilpflanze an vielen verschiedenen Stellen angeschnitten und gibt so die Wirkstoffe optimal in das Teewasser frei. Der Filterbeutel ist dabei ähnlich wie bei Tablette oder Dragee nur die Ummantelung der Wirkstoffe.

#### Warum muss der Tee von Sidroga so lange ziehen?

Die Ziehzeit eines Arzneitees richtet sich nach der Geschwindigkeit, mit der die Wirkstoffe aus der Heilpflanze in das Teewasser übergehen. Bei den meisten Arzneitees sind das 10 bis 15 Minuten. Da der Tee mit kochendem Wasser überbrüht wird, hat er dann auch genau die richtige Trinktemperatur.

#### Kann man Kinder-Hustentee dauerhaft anwenden?

Sidroga® Bio Kinder-Hustentee ist ein Arzneimittel und sollte daher ohne ärztliche Anordnung nicht dauerhaft angewendet werden. Wenn die Beschwerden länger als 7 Tage andauern oder periodisch wiederkehren, suchen Sie bitte Ihren Arzt auf.

#### Aus welchen Bestandteilen besteht der Bio Kinder-Hustentee im Einzelnen?

Sidroga® Bio Kinder-Hustentee besteht aus den Wirkstoffen Anis, Lindenblüten und Thymian – ohne weitere Zusätze. 1 Filterbeutel (à 1,5 g) enthält 0,6 g Anis, 0,6 g Lindenblüten und 0,3 g Thymian.

**Sidroga Bio Kinder-Hustentee: Anwendungsgebiete:** pflanzliches Arzneimittel zur Behandlung von Atemwegserkrankungen bei Symptomen der Bronchitis sowie zur Reizlinderung bei Katarrhen der oberen Luftwege mit trockenem Husten. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Sidroga GfGmbH, 56119 Bad Ems.



## Kindersaft 30 mg/5 ml

Lösung zum Einnehmen

Wirkstoff: Ambroxolhydrochlorid

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 4 – 5 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

### Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist MUCOSOLVAN Kindersaft 30 mg/5 ml und wofür wird er angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von MUCOSOLVAN Kindersaft 30 mg/5 ml beachten?
3. Wie ist MUCOSOLVAN Kindersaft 30 mg/5 ml einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist MUCOSOLVAN Kindersaft 30 mg/5 ml aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### **1. Was ist MUCOSOLVAN Kindersaft 30 mg/5 ml und wofür wird er angewendet?**

MUCOSOLVAN Kindersaft 30 mg/5 ml ist ein Arzneimittel zur Schleimlösung bei Atemwegserkrankungen mit zähem

Schleim (Expektorans).

MUCOSOLVAN Kindersaft 30 mg/5 ml wird angewendet zur Schleim lösenden Behandlung bei akuten und chronischen Erkrankungen der Bronchien und der Lunge mit zähem Schleim.

#### **2. Was sollten Sie vor der Einnahme von MUCOSOLVAN Kindersaft 30 mg/5 ml beachten?**

**MUCOSOLVAN Kindersaft 30 mg/5 ml darf nicht eingenommen werden,**

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen den Wirkstoff Ambroxolhydrochlorid oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

#### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie dieses Arzneimittel einnehmen.

Im Zusammenhang mit der Anwendung von Ambroxolhydrochlorid gab es Berichte über schwere Hautreaktionen. Falls bei Ihnen ein Hautausschlag auftritt (einschließlich Schleimhautschädigungen im Mund, Hals, Nase, Augen und Genitalbereich), beenden Sie bitte die Anwendung von MUCOSOLVAN Kindersaft 30 mg/5 ml und holen Sie unverzüglich ärztlichen Rat ein.

### **Patienten mit eingeschränkter Nieren- und Leberfunktion**

Wenn Sie an einer eingeschränkten Nierenfunktion oder an einer schweren Lebererkrankung leiden, darf MUCOSOLVAN Kindersaft 30 mg/5 ml nur auf ärztliche Anweisung hin eingenommen werden. Wie für jedes Arzneimittel, das von der Leber verstoffwechselt und dann über die Niere ausgeschieden wird, kann bei Vorliegen einer stark eingeschränkten Nierenfunktion eine Anhäufung der in der Leber gebildeten Stoffwechselprodukte (Metabolite) von Ambroxol erwartet werden.

Bei einigen seltenen Erkrankungen der Bronchien, die mit übermäßiger Sekretansammlung einhergehen (z. B. malignes Ziliensyndrom), sollte MUCOSOLVAN Kindersaft 30 mg/5 ml wegen eines möglichen Sekretstaus nur unter ärztlicher Kontrolle angewendet werden.

### **Kinder**

MUCOSOLVAN Kindersaft 30 mg/5 ml darf bei Kindern unter 2 Jahren nur auf ärztliche Anweisung hin angewendet werden.

### **Einnahme von MUCOSOLVAN Kindersaft 30 mg/5 ml zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

### **Ambroxol/Antitussiva**

Bei kombinierter Anwendung von MUCOSOLVAN Kindersaft 30 mg/5 ml und hustenstillenden Mitteln (Antitussiva) kann bei Patienten mit vorliegenden Atemwegserkrankungen, die mit einer vermehrten Bildung von Schleim einhergehen, wie zystische Fibrose oder Bronchiektasie, aufgrund des eingeschränkten Hustenreflexes ein (gefährlicher) Sekretstau entstehen.

### **Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit**

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

#### **Schwangerschaft**

Ambroxol erreicht das ungeborene Kind. Klinische Erfahrungen nach der 28. Schwangerschaftswoche haben keinen Hinweis auf schädliche Auswirkungen auf das ungeborene Kind ergeben. Dennoch sollten Sie dieses Arzneimittel während der Schwangerschaft nicht einnehmen, insbesondere nicht während der ersten 3 Monate.

#### **Stillzeit**

Der Wirkstoff Ambroxol geht im Tierversuch in die Muttermilch über. Auch wenn keine schädlichen Auswirkungen auf das Kind zu erwarten sind, wird eine Anwendung während der Stillzeit nicht empfohlen.

#### **Fortpflanzungsfähigkeit**

Nichtklinische Studien ergaben keine Hinweise auf schädliche Auswirkungen auf die Zeugungs- oder Gebärfähigkeit.

### **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Es gibt keine Hinweise für eine Beeinflussung der Verkehrstüchtigkeit und der Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen; entsprechende Studien sind nicht durchgeführt worden.

## **MUCOSOLVAN Kindersaft 30 mg/5 ml enthält Sorbitol.**

Dieses Arzneimittel enthält ca. 1,2 g Sorbitol pro 5 ml. Sorbitol ist eine Quelle für Fructose. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt bevor Sie (oder Ihr Kind) dieses Arzneimittel einnehmen oder erhalten, wenn Ihr Arzt Ihnen mitgeteilt hat, dass Sie (oder Ihr Kind) eine Unverträglichkeit gegenüber einigen Zuckern haben oder wenn bei Ihnen eine hereditäre Fructoseintoleranz (HFI) – eine seltene angeborene Erkrankung, bei der eine Person Fructose nicht abbauen kann – festgestellt wurde.

## **MUCOSOLVAN Kindersaft 30 mg/5 ml enthält Benzoessäure.**

Dieses Arzneimittel enthält 8,5 mg Benzoessäure pro 5 ml Lösung. Benzoessäure kann Gelbsucht (Gelbfärbung von Haut und Augen) bei Neugeborenen (im Alter bis zu 4 Wochen) verstärken.

## **MUCOSOLVAN Kindersaft 30 mg/5 ml enthält Propylenglycol.**

Dieses Arzneimittel enthält 12,5 mg Propylenglycol pro 5 ml Lösung. Wenn Ihr Baby weniger als 4 Wochen alt ist, sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker bevor Sie ihm dieses Arzneimittel geben, insbesondere, wenn Ihr Baby gleichzeitig andere Arzneimittel erhält, die Propylenglycol oder Alkohol enthalten.

### **3. Wie ist MUCOSOLVAN Kindersaft 30 mg/5 ml einzunehmen?**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:

### **Kinder bis 2 Jahre: nur auf ärztliche Anweisung**

Es werden 2-mal täglich 1,25 ml Lösung eingenommen (entsprechend 15 mg Ambroxolhydrochlorid/Tag).

### **Kinder von 2 bis 5 Jahren:**

Es werden 3-mal täglich 1,25 ml Lösung eingenommen (entsprechend 22,5 mg Ambroxolhydrochlorid/Tag).

### **Kinder von 6 bis 12 Jahren:**

Es werden 2 – 3-mal täglich 2,5 ml Lösung eingenommen (entsprechend 30 – 45 mg Ambroxolhydrochlorid/Tag).

### **Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren:**

In der Regel werden während der ersten 2 – 3 Tage 3-mal täglich 5 ml Lösung (entsprechend 90 mg Ambroxolhydrochlorid/Tag) eingenommen, danach werden 2-mal täglich 5 ml Lösung (entsprechend 60 mg Ambroxolhydrochlorid/Tag) eingenommen.

Bei der Dosierung für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren ist eine Steigerung der Wirksamkeit gegebenenfalls durch die Gabe von 2-mal täglich 10 ml Lösung (entsprechend 120 mg Ambroxolhydrochlorid/Tag) möglich.

| Dosierungsschema            |                |
|-----------------------------|----------------|
| Lebensalter                 | Tagesdosis     |
| 0 – 2 Jahre:                |                |
| Nur auf ärztliche Anweisung | 2 x 1,25 ml    |
| 2 – 5 Jahre                 | 3 x 1,25 ml    |
| 6 – 12 Jahre                | 2 – 3 x 2,5 ml |
| Ab 12 Jahre:                |                |
| An den ersten 2 – 3 Tagen   | 3 x 5 ml       |
| Danach                      | 2 x 5 ml       |

### **Art und Dauer der Anwendung**

MUCOSOLVAN Kindersaft 30 mg/5 ml ist eine Lösung zum Einnehmen.

MUCOSOLVAN Kindersaft 30 mg/5 ml wird zu oder unabhängig von den Mahlzeiten mit Hilfe der beigegefügt Dosierhilfe (Messbecher) eingenommen.

Bitte reinigen Sie den Messbecher nach der Anwendung durch Ausspülen mit warmem Wasser.

Wenn sich Ihr Krankheitsbild verschlimmert oder nach 4 – 5 Tagen keine Besserung eintritt, sollten Sie einen Arzt aufsuchen.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von MUCOSOLVAN Kindersaft 30 mg/5 ml zu stark oder zu schwach ist.

#### **Wenn Sie eine größere Menge MUCOSOLVAN Kindersaft 30 mg/5 ml eingenommen haben, als Sie sollten**

Spezielle Krankheitserscheinungen einer Überdosierung sind bis jetzt nicht berichtet worden. Die bei versehentlicher Überdosierung oder Arzneimittelverwechslung beobachteten Krankheitsanzeichen stimmen mit den Nebenwirkungen überein, die bei der empfohlenen Dosierung auftreten können (siehe Kapitel 4). Bitte wenden Sie sich im Falle einer Überdosierung an einen Arzt, da eine Therapie der Krankheitsanzeichen erforderlich sein kann.

#### **Wenn Sie die Einnahme von MUCOSOLVAN Kindersaft 30 mg/5 ml vergessen haben**

Wenn Sie einmal vergessen haben, MUCOSOLVAN Kindersaft 30 mg/5 ml einzunehmen, oder zu wenig eingenommen haben, setzen Sie bitte zum nächsten Zeitpunkt die Einnahme von MUCOSOLVAN Kindersaft 30 mg/5 ml fort, wie in der Dosierungsanleitung beschrieben.

#### **Wenn Sie die Einnahme von MUCOSOLVAN Kindersaft 30 mg/5 ml abbrechen**

Bei vorzeitigem Abbruch der Behandlung können sich die Symptome verschlimmern.

## **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann MUCOSOLVAN Kindersaft 30 mg/5 ml Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwirkungen werden folgende Kategorien zugrunde gelegt:

|                |                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------|
| Sehr häufig:   | kann mehr als 1 von 10 Behandelten betreffen                     |
| Häufig:        | kann bis zu 1 von 10 Behandelten betreffen                       |
| Gelegentlich:  | kann bis zu 1 von 100 Behandelten betreffen                      |
| Selten:        | kann bis zu 1 von 1.000 Behandelten betreffen                    |
| Sehr selten:   | kann bis zu 1 von 10.000 Behandelten betreffen                   |
| Nicht bekannt: | Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar |

### **Nebenwirkungen**

#### **Erkrankungen des Immunsystems**

|                |                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Selten:        | Überempfindlichkeitsreaktionen                                                                                                                                                                                 |
| Nicht bekannt: | Allergische Reaktionen bis hin zum anaphylaktischen Schock, Angioödem (sich rasch entwickelnde Schwellung der Haut, des Unterhautgewebes, der Schleimhaut oder des Gewebes unter der Schleimhaut) und Juckreiz |

#### **Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes**

|                |                                                                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Selten:        | Hautausschlag, Nesselsucht                                                                              |
| Nicht bekannt: | Schwere Hautreaktionen (einschließlich Erythema multiforme, Stevens-Johnson-Syndrom/toxische epidermale |

Nekrolyse und akute  
generalisierte exan-  
thematische Pustulose)

### **Erkrankungen des Nervensystems**

Häufig: Geschmacksstörungen

### **Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts**

Häufig: Übelkeit, Taubheitsgefühl  
im Mund

Gelegentlich: Erbrechen, Durchfall,  
Verdauungsstörungen,  
Bauchschmerzen,  
Mundtrockenheit

Selten: Trockenheit im Hals

Sehr selten: vermehrter Speichelfluss

### **Erkrankungen der Atemwege, des Brustraums und des Mediastinums**

Häufig: Taubheitsgefühl im Rachen

Nicht bekannt: Atemnot  
(als Anzeichen einer  
Überempfindlichkeits-  
reaktion)

### **Allgemeine Erkrankungen und Beschwerden am Verabreichungsort**

Gelegentlich: Fieber, Schleimhaut-  
reaktionen

### **Gegenmaßnahmen**

Bei den ersten Anzeichen einer  
Überempfindlichkeitsreaktion darf  
MUCOSOLVAN Kindersaft 30 mg/5 ml  
nicht nochmals eingenommen werden.

### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken,  
wenden Sie sich an Ihren Arzt oder  
Apotheker. Dies gilt auch für Neben-  
wirkungen, die nicht in dieser Packungs-  
beilage angegeben sind. Sie können  
Nebenwirkungen auch direkt dem  
Bundesinstitut für Arzneimittel und  
Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz,  
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175  
Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen.  
Indem Sie Nebenwirkungen melden,  
können Sie dazu beitragen, dass mehr  
Informationen über die Sicherheit dieses  
Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

## **5. Wie ist MUCOSOLVAN Kindersaft 30 mg/5 ml aufzubewahren?**

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder  
unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach  
dem auf dem Etikett und dem Umkarton  
nach „Verwendbar bis“ angegebenen  
Verfalldatum nicht mehr verwenden.  
Das Verfalldatum bezieht sich auf den  
letzten Tag des angegebenen Monats.

### **Aufbewahrungsbedingungen**

Für dieses Arzneimittel sind keine besonde-  
ren Lagerungsbedingungen erforderlich.

### **Hinweis auf die Haltbarkeit nach Anbruch**

Nach Anbruch der Flasche beträgt die  
Haltbarkeit noch 6 Monate.

Entsorgen Sie Arzneimittel niemals über  
das Abwasser (z. B. nicht über die  
Toilette oder das Waschbecken). Fragen  
Sie in Ihrer Apotheke, wie das Arznei-  
mittel zu entsorgen ist, wenn Sie  
es nicht mehr verwenden. Sie tragen  
damit zum Schutz der Umwelt bei.  
Weitere Informationen finden Sie unter  
[www.bfarm.de/arzneimittelentsorgung](http://www.bfarm.de/arzneimittelentsorgung).

## **6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**

### **Was MUCOSOLVAN Kindersaft 30 mg/5 ml enthält:**

Der Wirkstoff ist: Ambroxolhydrochlorid  
5 ml Lösung enthalten 30 mg  
Ambroxolhydrochlorid.

Die sonstigen Bestandteile sind:

Benzoessäure, Sorbitol-Lösung 70 %  
(nicht kristallisierend),  
Hydroxyethylcellulose, Glycerol 85 %,  
Acesulfam-Kalium, Aromastoffe  
(enthalten Propylenglycol), gereinigtes  
Wasser

## Wie MUCOSOLVAN Kindersaft 30 mg/5 ml aussieht und Inhalt der Packung:

MUCOSOLVAN Kindersaft 30 mg/5 ml ist eine farblose Flüssigkeit mit fruchtigem Geruch in einer Braunglasflasche mit kindergesichertem Schraubverschluss.

MUCOSOLVAN Kindersaft 30 mg/5 ml ist in Packungen mit 100 ml bzw. 250 ml erhältlich.

## Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

### Pharmazeutischer Unternehmer

A. Nattermann & Cie. GmbH  
Brüningstraße 50  
65929 Frankfurt am Main  
Telefon: 0800 56 56 010  
Telefax: 0800 56 56 011

### Hersteller

Opella Healthcare Italy S.r.l.  
Viale Europa 11  
21040 Origgio (Va)  
Italien

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Juli 2022.**

[www.mucosolvan.de](http://www.mucosolvan.de)

Die beigegefügte Dosierhilfe (Messbecher) ist ein Medizinprodukt und trägt die Kennzeichnung

**CE 0459.**

Hersteller der Dosierhilfe:

UNION PLASTIC, Z.A. Robert – B.P. 27,  
F-43140 Saint Didier en Velay

Kindergesicherter Flaschenverschluss:

1. Messbecher von der Verschlusskappe abnehmen.
2. Verschlusskappe zum Öffnen nach unten drücken.
3. Verschlusskappe gleichzeitig in Pfeilrichtung drehen.

