

LyZink gegen Herpes® 15 Kapseln

Produktbeschreibung:

Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät)
Zum Diätmanagement bei nutritiv bedingtem Herpes simplex Labialis.

Nettofüllmenge:

15 Kps. = 7,6 g

Zutaten:

L-Lysinhydrochlorid (Mais), Gelatine (Rind), Zinkgluconat, Trennmittel
Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Farbstoff E 171

Pro Kapsel:

1 Kapsel enthält: 400 mg Lysin HCl und 2,6 mg Zink

Nährwertangaben:

	pro 1 Kapsel	pro 7 Kapseln	% RM * *Referenzmenge gemäß LMIV	100 g
L-Lysin HCl	0,4 g	2,8 g	kA	62 g
Zink	2,6 mg	18 mg	180%*	500 mg
Nährwertangaben				
Energie	5,7kJ / 1,3kcal	40kJ / 9kcal	0,5 / 0,5	1115 kJ / 262 kcal
Fett	0,001 g	0,01 g	0,02	0,4 g
-davon gesättigte Fettsäuren	0,001 g	0,01 g	0,05	0,4 g
Kohlenhydrate	0,01 g	0,1 g	0,04	2,7 g
-davon Zucker	0	0	0	0
Eiweiß	0,3 g	2,2 g	4,4	62,0 g
Salz	0	0	0	0

Verzehrempfehlung:

Als Erstdosis: Bei den ersten Anzeichen von Lippenherpes 3 Kapseln unzerkaut mit etwas Flüssigkeit verzehren. Danach bis zu 4 x 1 Kapsel im Abstand von jeweils 2 Stunden einnehmen.
Ab dem 2. Tag 4 x1 Kapsel täglich bis alle Kapseln aufgebraucht sind.

Als Erhaltungsdosis:

Zur weiteren Aufrechterhaltung des Lysinspiegels nehmen Sie 1-3 Kapseln pro Tag.

LyZink gegen Herpes® sollte nicht zusammen mit Calciumpräparaten verzehrt werden.

Wichtige Hinweise:

LyZink gegen Herpes® ist kein vollständiges Lebensmittel, sondern eine ergänzende bilanzierte Diät, die zweckmäßig im Rahmen eines Diätplans und unter ärztlicher Aufsicht verwendet wird.

LyZink gegen Herpes® sollte entsprechend der Verzehrempfehlung und gemäß ärztlichem Rat verzehrt werden. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.

LyZink gegen Herpes® soll nicht bei schwerem Nierenschaden, akutem Nierenversagen und aktiven Autoimmunerkrankungen eingenommen werden sowie nicht in Schwangerschaft und Stillzeit.

4 Wochen vor Operationen sollte es abgesetzt werden wegen möglicher butverdünnender Eigenschaften.

Aufgrund des speziellen Mineralstoffbedarfs der betroffenen Patienten ist der Gehalt an Zink erhöht.

Aufbewahrung:

Bei Raumtemperatur, trocken, stets verschlossen und außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.

Unternehmen:

Canea Pharma GmbH, 22419 Hamburg

PZN:

14213478

Stand:

Januar 2019